

СЪХРАНИ ЖИВОТА с FORXIGA при пациенти с хронична СН^{*,1-3}

FORXIGA вече е одобрен
и за лечение на
симптоматична хронична
сърдечна недостатъчност
със запазена фракция на
изтласкване.



Изображението е с илюстративна цел и не е на реални пациенти.

*Симптоматична хронична СН. В проучването DAPA-HF първичната крайна цел показва, че FORXIGA, добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за комбинацията от влошаване на СН[†] или СС смърт с 26% (4.9% ARR) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СННФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца; P<0.001). В проучването DELIVER първичната крайна цел е комбинацията от влошаване на СН[†] или СС смърт. Проучването DELIVER показва, че FORXIGA, добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за комбинацията от влошаване на СН[†] или СС смърт с 18% (3.1% ARR) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 6263 възрастни пациенти със СНлнФИ и СНзФИ (медиана на проследяване 2.3 години; P<0.001). В предварително определен обобщен анализ на пациентско ниво на проучванията DELIVER и DAPA-HF, FORXIGA статистически значимо намалява относителния риск за СС смърт с 14% (HR: 0.86 (95% CI: 0.76-0.97)) и относителния риск за смърт поради всякаква причина с 10% (HR: 0.90 (95% CI: 0.82-0.99)) независимо от ЛКФИ.³ В DAPA-HF и DELIVER FORXIGA демонстрира благоприятен профил на безопасност.^{1,3} Като цяло профилът на безопасност на дапаглифлозин при пациентите със сърдечна недостатъчност съответства на познатия профил на безопасност на дапаглифлозин. [†]Влошаване на СН се дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).

СН, сърдечна недостатъчност; СНзФИ, сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване; СНлнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; СС, сърдечносъдов; ЗДТ2, захарен диабет тип 2; ХБЗ, хронично бъбречно заболяване; SGLT2, натрево-глюкозен котраспортер 2; СНлнФИ, сърдечна недостатъчност с леко намалена фракция на изтласкване; HR, коефициент на риск; ARR, намаляване на абсолютния риск; CI, доверителен интервал.

Литература: 1. McMurray JJV, et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008. 2. Solomon SD, et al. N Engl J Med. 2022;387(12):1089-1098. 3. Jhund PS, et al. Nat Med. 2022;28(9):1956-1964.

FORXIGA е показан при възрастни и деца на възраст 10 и повече години за лечение на недостатъчно контролиран ЗДТ2 като добавка към диета и физическа активност: като монотерапия, когато употребата на метформин се смята за неуместна поради непоносимост; като добавка към други лекарствени продукти за лечение на ЗДТ2. FORXIGA е показан при възрастни за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност. FORXIGA е показан при възрастни за лечение на ХБЗ. Лекарственият продукт FORXIGA се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпришете FORXIGA моля, консултирайте се с кратката характеристика на продукта, която е достъпна при сканиране на QR кода.



Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междуременно е настъпила бременност или ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля, свържете се с нас на тел. +359 2 44 55 000 или факс +359 2 971 11 24 или съобщете за това директно през платформата <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на подозирани нежелани лекарствени реакции към Изпълнителната агенция по лекарствата.

За информация относно лекарствените продукти на АстраЗенека можете да се свържете с нас на горепосочените телефон и факс или да зададете своето запитване директно през платформата <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>. BG-7068/04.2023 г.

AstraZeneca

АстраЗенека България, 1407 София, бул. „Черни връх“ №51, Business Garden Office X, ет. 10, тел. +359 2 44 55 000, факс +359 2 971 11 24.


forxiga
(dapagliflozin) 10mg филмირани таблетки