

BEWIM®
prasugrel



Силата да възродиш!

**ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
ПРИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОКС!**


**БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ
КЪРВЕНЕ¹**




ГЕДЕОН РИХТЕР

При пациентите с ОКС, подлежащи на PCI, лечението с **prasugrel** в сравнение с **ticagrelor** намалява сигнификантно честотата на **смърт, МИ, или инсулт** без повишаване честотата на голямото кървене¹


При пациенти с ОКС без ST-елевация, подлежащи на PCI, лечението с **prasugrel** в сравнение с **ticagrelor** намалява сигнификантно честотата на **смърт, МИ, или инсулт**, без да увеличава риска за кървене³




*първична крайна цел: кумулативна честота за смъртност, МИ, инсулт



*първична крайна цел: кумулативна честота за смъртност, МИ, инсулт



**цел за безопасност: кумулативна честота на случаи на кървене тип 3, 4, или 5 по BARC



**цел за безопасност: кумулативна честота на случаи на кървене тип 3, 4, или 5 по BARC

Препоръки за анти тромбозно лечение при пациенти с миокарден инфаркт с ST-елевация подлежащи на PCI, 2018 ESC Guidelines on revascularisation²

Мощен P2Y₁₂-инхибитор (**PRASUGREL** или ticagrelor) или клопидогрел, ако не разполагаме с първите или те са противопоказани, се препоръчва преди (или най-късно по време на) PCI и се продължава 12 месеца, освен при наличие на противопоказания, като прекомерен хеморагичен риск.

I


A

Препоръки за анти тромбозно лечение при пациенти с ОКС без ST-елевация и без ПМ, подлежащи на PCI, 2020 ESC Guidelines for the management of ACS in patients presenting without persistent ST-segment elevation⁴

PRASUGREL трябва да се предпочита пред ticagrelor при пациенти с ОКС без ST-елевация, подлежащи на PCI

IIa

B



АКТУАЛНА ЦЕНА
ЗА ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТ



Референции:

1. адаптирано по: Schüpke S, Neumann FJ, Menichelli M, et al., on behalf of the ISAR-REACT 5 Trial Investigators. Ticagrelor or Prasugrel in Patients With Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2019; Sept 1
2. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization, European Heart Journal, Volume 40, Issue 2, 07 January 2019, Pages 87–165
3. Valina C, et al. Ticagrelor or Prasugrel in Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes. J Am Coll Cardiol. 2020 Nov 24;76(21):2436-2446.
4. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation, European Heart Journal (2020) 00, 1-79

ОКС - остър коронарен синдром
 PCI - перкутантна коронарна интервенция
 МИ - миокарден инфаркт
 ПМ - предсърдно мъждене

По лекарско предписание!

За пълна информация: 1330 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е,
 Бизнес Център "Сердика", тел.: 02/812 90 85; 02/812 90 63, факс: 02/812 90 76
 Лекарствена безопасност и медицинска информация тел.: 02/812 90 77
 КХП: 20180315/30.12.2019



ГЕДЕОН РИХТЕР