



**В РИТЪМА  
НА СЪРЦЕТО**

ИАЛ-6823/17.02.2025

# Felkarid

**flecainide acetat**


50 mg, 100 mg x 30 филмирани таблетки



**ALKALOID**


*Здравото ни е най-важното!*

## Кумулативната честота на резултатите от проучването от групите за лечение на ПМ. От по-висока смъртност към по-ниска смъртност:



Коригирани по възраст и пол анализи на Каплан-Майер за кумулативната честота на резултатите от проучването от групите за лечение на ПМ.

Пациентите с нововъзникнало ПМ, получаващи лечение за контрол на ритъма, имат значително по-ниска смъртност от пациентите, които не получават лечение за контрол на ритъма (  $P < 0,001$ ). Най-изразено намаляване на риска се наблюдава при изолация на белодробна вена, последвано от флекаинид



Коригиран коефициент на риск за смъртност. Контрол на ритъма срещу липса на контрол на ритъма при инцидентни пациенти с ПМ  
Многовариантно коригирани регресионни анализи на Кокс за риск от смъртност чрез контрол на ритъма или инвазивни стратегии за лечение.

**Сред пациентите с нововъзникнало ПМ се наблюдава благоприятна преживяемост при пациенти, получаващи лечение за контрол на ритъма. Изолирането на белодробната вена се свързва с две трети намаление на смъртността в сравнение с липса на контрол на ритъма. Използването на флекаинид е свързано с 50% намаление на риска от смъртност**

Sheng-Chia Chung, Alvina Lai, Gregory Y H Lip, Pier D Lambiase, Rui Providencia, Impact of anti-arrhythmic drugs and catheter ablation on the survival of patients with atrial fibrillation: a population study based on 199 433 new-onset atrial fibrillation patients in the UK, EP Europace, Volume 25, Issue 2, February 2023, Pages 351-359, <https://doi.org/10.1093/europace/euac155>. Licensed under: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Real-World Data UK | Какво е новото?

- Представени са реални данни от национални електронни здравни досиета в Обединеното кралство за различни стратегии за контрол на ритъма за управление на предсърдно мъждане.
- Изолирането на белодробната вена е стратегията, показваща най-ясно изразената полза за преживяемостта.
- Сред антиаритмичните медикаменти флекаинидът се свързва с най-голямо намаляване на смъртността.
- Амиодарон не показва полза за преживяемостта при индивиди на възраст <70 години.
- За всички други опции за контрол на ритъма ефектът върху преживяемостта не се различава в зависимост от възрастта, пола или историята на сърдечна недостатъчност.

Sheng-Chia Chung, Alvina Lai, Gregory Y H Lip, Pier D Lambiase, Rui Providencia, Impact of anti-arrhythmic drugs and catheter ablation on the survival of patients with atrial fibrillation: a population study based on 199 433 new-onset atrial fibrillation patients in the UK, EP Europace, Volume 25, Issue 2, February 2023, Pages 351-359, <https://doi.org/10.1093/europace/euac155>. Licensed under: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Код НЗОК за МКБ I47.1, I48: CA210  
Код НЗОК за МКБ I45.6: CA106

Код НЗОК за МКБ I47.1, I48: CA211  
Код НЗОК за МКБ I45.6: CA105

# Felkarid

## flecainide acetat

50 mg, 100 mg x 30 филмирани таблетки

Лекарство по лекарско предписание

КПХ: 16.06.2021

  
**ALKALOID**

АЛКАЛОИД ЕООД

СОФИЯ 1407

бул. Никола Вапцаров 51-А, ет. 4

тел.: +359 2 8081081

[www.alkaloid.bg](http://www.alkaloid.bg)