

VEPCO

КАТАЛОГ 2026

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

VEPCO

Антипаразитни
Таблетки за вътрешни и външни паразити за кучета и котки

INSPECTOR QUADRO TABS за кучета и котки > 0.5-2 kg (кутия 2 x 2 табл.)
Lufenuron 20 mg + Moxidectin 0,6 mg + Praziquantel 10 mg в таблетка — 1

INSPECTOR QUADRO TABS за кучета и котки > 2-8 kg (кутия 2 x 2 табл.)
Lufenuron 40 mg + Moxidectin 1,2 mg + Praziquantel 20 mg в таблетка — 1

INSPECTOR QUADRO TABS за кучета и котки > 8-16 kg (кутия 2 x 2 табл.)
Lufenuron 160 mg + Moxidectin 4,8 mg + Praziquantel 80 mg в таблетка — 1

INSPECTOR QUADRO TABS за кучета > 16 kg (кутия 2 x 2 табл.)
Lufenuron 320 mg + Moxidectin 9,6 mg + Praziquantel 160 mg в таблетка — 1

Антипаразитни
Spot-on за вътрешни и външни паразити за кучета

INSPECTOR QUADRO C Spot-on за кучета 1-4 kg 0,4 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg в ml — 2

INSPECTOR QUADRO C Spot-on за кучета 4-10 kg 1 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg в ml — 2

INSPECTOR QUADRO C Spot-on за кучета 10-25 kg 2,5 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg в ml — 2

INSPECTOR QUADRO C Spot-on за кучета 25-40 kg 4 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg в ml — 2

INSPECTOR QUADRO C Spot-on за кучета 40-60 kg 6 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg в ml — 2

Антипаразитни
Spot-on за вътрешни и външни паразити за котки

INSPECTOR QUADRO K Spot-on за котки 1-4 kg 0,4 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 10,7 mg в ml — 3

INSPECTOR QUADRO K Spot-on за котки 4-8 kg 0,8 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 10,7 mg в ml — 3

INSPECTOR QUADRO K Spot-on за котки 8-15 kg 1,5 ml (1 пипета)
Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 10,7 mg в ml — 3

Антипаразитни
Таблетки за вътрешни паразити за кучета и котки

ALPRAMIL DOG таблетки делими на 4 за кучета > 0,5 - 10 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 5 mg + Praziquantel 50 mg в таблетка — 4

ALPRAMIL DOG таблетки за кучета > 5 - 25 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 12,5 mg + Praziquantel 125 mg в таблетка — 4

ALPRAMIL DOG таблетка за кучета > 8 - 40 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 20 mg + Praziquantel 200 mg в таблетка — 4

ALPRAMIL CAT таблетки делими на 2 за котки > 0,5 - 2 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 4 mg + Praziquantel 10 mg в таблетка — 5

ALPRAMIL CAT таблетки за котки > 3 - 6 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 12 mg + Praziquantel 30 mg в таблетка — 5

ALPRAMIL CAT таблетки за котки > 4 - 8 kg (кутия 10 x 4 табл.)
Milbemycin oxime 16 mg + Praziquantel 40 mg в таблетка — 5

DIHELVET TABLETS (кутия 1 x 10 табл.)
Pyrantel pamoate 150 mg + Praziquantel 50 mg + Ivermectin 0,06 mg в таблетка — 6

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

VEPCO

Антипаразитни
Каишки за външни паразити за кучета и котки

INSECTAL COLLAR (каишка 40 cm)
Fipronil 0,73 + Pyriproxyfen 0,29 g в каишка — 6

INSECTAL COLLAR (каишка 65 cm)
Fipronil 1,29 + Pyriproxyfen 0,52 g в каишка — 6

INSECTAL COLLAR (каишка 75 cm)
Fipronil 2,59 + Pyriproxyfen 1,03 g в каишка — 6

Антибактериални
Таблетни

CLAVUSAN *таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Amoxicillin 50 + Clavulanic acid 12,5 mg в таблетка — 7

CLAVUSAN *таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Amoxicillin 250 + Clavulanic acid 62,5 mg в таблетка — 7

CLAVUSAN *таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Amoxicillin 500 + Clavulanic acid 125 mg в таблетка — 7

METROBACTIN *таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Metronidazole 250 mg в таблетка — 8

METROBACTIN *таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Metronidazole 250 mg в таблетка — 8

Антибактериални
Инжективни

CLAVON инжекционна суспензия (50 ml)
Amoxicillin 140 + Clavulanic acid 35 mg в ml — 8

Кардиологични

CARDISAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Pimobendan 1,25 mg в таблетка — 9

CARDISAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Pimobendan 2,5 mg в таблетка — 9

CARDISAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Pimobendan 5 mg в таблетка — 9

CARDISAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 10 x 10 табл.)
Pimobendan 10 mg в таблетка — 9

Антиепилептични

PHENOSAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 25 x 10 табл.)
Phenobarbital 12,5 mg в таблетка — 10

PHENOSAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 25 x 10 табл.)
Phenobarbital 50 mg в таблетка — 10

PHENOSAN *дъвчащи таблетки делими на 4* (кутия 25 x 10 табл.)
Phenobarbital 100 mg в таблетка — 10

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

VEPCO

НСПВС
Инжективни

METAXX инжекционен разтвор (20 ml)
Meloxicam 5 mg в ml  11

METAXX инжекционен разтвор (100 ml)
Meloxicam 20 mg в ml  11

НСПВС
Перорални

METAXX перорална суспензия (100 ml)
Meloxicam 1,5 mg в ml  12

НСПВС
Таблетни

METAXX делими на 4 таблетки за дъвчене (кутия 9 x 10 табл.)
Meloxicam 0,25 mg в таблетка  12

Аналгезия | Премедикация | Седация | Анестезия
Инжективни

DORMOSTART инжекционен разтвор (10 ml)
Medetomidine 1 mg в ml  13

DEXDORMOSTART инжекционен разтвор (10 ml)
Dexmedetomidine 0,5 mg в ml  14

DORMOSTOP инжекционен разтвор (10 ml)
Atipamezole 5 mg в ml  16

PRESEDINE инжекционен разтвор (10 ml)
Detomidine 10 mg в ml  17

RECUDON инжекционен разтвор (10 ml)
Levomethadone 2,5 mg + Fenpipramide 0,125 mg в ml  18

RECUDON инжекционен разтвор (30 ml)
Levomethadone 5 mg + Fenpipramide 0,25 mg в ml  18

Гастроинтестинални

PREVOMAX инжекционен разтвор (20 ml)
Maropitant 10 mg в ml  19

Урологични

URIPHEX перорален разтвор (100 ml)
Phenylpropanolamine 50 mg в ml  19

Имунологични
Серуми

BODYGLOB хомоложен хиперимунен серум (5 ml)
Canine Parvovirus + Canine Distemper Virus + Canine Adenovirus + Canine Parainfluenza Virus  20

Имунологични
Ваксини за едри преживни

ROTAGAL инжекционна емулсия (5 дози)
Bovine Escherichia coli + Bovine Corona virus + Bovine Rota virus  20

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

VEPCO

Имунологични
Ваксини за гълъби

COLUMBA инжекционна емулсия (50 дози)
Pigeon Paramyxovirus — 21

PHARMAVAC COLUMBI 2 инжекционна емулсия (50 дози)
Pigeon Paramyxovirus + Pigeon Herpes Virus — 21

PHARMAVAC PHA инжекционна емулсия (50 дози)
Pigeon Paramyxovirus + Pigeon Herpes Virus + Pigeon Adeno Virus — 21

RP VACC инжекционна емулсия (50 дози)
Pigeon Paramyxovirus + Pigeon Rota Virus — 22

DIFTOVAC инжекционна емулсия (50 дози)
Pigeon Pox Virus — 22

Имунологични
Ваксини за зайци

CASTOREX RHDV2 инжекционна суспензия (1, 10 и 20 дози)
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus type 2 — 23

Евтаназия

EUTHANIMAL инжекционен разтвор (100 ml)
Pentobarbital 400 mg в ml — 24

ДИАГНОСТИКА

VEPCO

Бързи тестове за кучета
Единични тестове за вирусни и гастроинтестинални заболявания

CPV Ag Test
Бързо откриване на Canine Parvovirus Ag във фекална проба — 25

CDV Ag Test
Бързо откриване на Canine Distemper Virus Ag в очен и назален секрет — 25

Giardia Ag Test kit
Бързо откриване на Giardia Ag във фекална проба — 25

Бързи тестове за кучета
Комбинирани тестове за вирусни и гастроинтестинални заболявания

CPV Ag/CDV Ag Combo Test kit
Бързо откриване на Canine Distemper Virus Ag и Canine Parvovirus Ag — 26

VLabs 3DX Combo Test kit
Бързо откриване на Canine Parvovirus Ag, Canine Coronavirus Ag и Giardia Ag във фекална проба — 26

Бързи тестове за кучета
Единични бързи тестове за векторно-преносими заболявания

CHW Ag Test kit
Бързо откриване на Dirofilaria immitis Ag в кръв, серум или плазма — 27

Leishmania Ab Test kit
Бързо откриване на Leishmania Ab в кръв, серум или плазма — 27

Lyme Ab Test kit
Бързо откриване на B. Burgdorferi Ab в кръв, серум или плазма — 27

ДИАГНОСТИКА

VEPCO

Бързи тестове за кучета
Комбинирани бързи тестове за векторно-преносими заболявания

VLabs 4BX Plus Combo Test kit  28
Бързо откриване на Babesia spp.(Gibsoni & Canis) Ab, E. canis Ab, Anaplasma phagocytophilum & platys Ab и Dirofilaria immitis Ag в кръв, серум или плазма

VLabs 4X Combo Test kit  29
Бързо откриване на Borrelia burgdorferi (Lyme) Ab, E. Canis Ab, Anaplasma phagocytophilum & platys Ab и Dirofilaria immitis Ag в кръв, серум или плазма

VLabs 4LX Combo Test kit  30
Бързо откриване на Leishmania Ab, E. canis Ab, Anaplasma phagocytophilum & platys Ab и Dirofilaria immitis Ag в кръв, серум или плазма

Бързи тестове за котки
Единични бързи тестове за вирусни и гастроинтестинални заболявания

FPV Ag Test kit  31
Бързо откриване на F. Panleukopenia Virus Ag във фекална проба

FCoV Ag Test kit  31
Бързо откриване на F. Coronavirus Ag във фекална проба

FCoV Ab Test kit  32
Бързо откриване на F. Coronavirus Ab в серум, плазма, плеврален излив или асцитна течност

FIV Ab Test kit  32
Бързо откриване на F. Immunodeficiency Virus Ab в кръв, серум или плазма

Бързи тестове за котки
Комбинирани бързи тестове за вирусни и гастроинтестинални заболявания

Feline 3DX Combo Test kit  33
Бързо откриване на FPV Ag, FCoV Ag и Giardia Ag във фекална проба

Feline 3X Combo Test kit  33
Бързо откриване на FeLV Ag, FIV Ab, FCoV Ab в серум, плазма, плеврален излив и асцит

FeLV Ag/FIV Ab Combo Test kit  34
Бързо откриване на FeLV Ag и FIV Ab в кръв, серум или плазма

FCV Ag/FHV Ag Combo Test kit  34
Бързо откриване на FCV Ag и FHV Ag в очен и назален секрет

Бързи тестове за котки
Бързи тестове за паразитни заболявания

Toxoplasma IgM/IgG Ab Test kit  35
Бързо и откриване на Toxoplasma IgM/IgG в кръв

Giardia Ag Test kit  35
Бързо откриване на Giardia Ag във фекална проба

Други диагностични тестове
Комбинирани бързи тестове за векторно-преносими заболявания

Feline Blood Typing Test kit  36
Тест комплект за определяне на кръвна група A, B или AB

Peritonitis Detection Test kit  36
Бързо откриване или изключване на перитонит

Бързи тестове за птици и влечуги

Salmonella Ag Test kit  37
Бързо и откриване на Salmonella Ag във фекална проба

ДИАГНОСТИКА

VEPCO

Диагностика на дерматофити

Dermatophyte Test
Хранителна среда за култивиране и идентифициране на дерматофити

37

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

VEPCO

Гастроинтестинални

PROFICARB GEL (100 ml)
Активен въглен (30%).
При лошо храносмилане (диария), предотвратяване на токсемия

38

ENTEROLYT COMPLETE (90 g)
При храносмилателни смущения и диария.
Балансира течности и електролити в организма

38

DIALACTU (100 ml)
При запек.
Компенсиране на лошо храносмилане, екзокринна недостатъчност на панкреаса

39

DIACUREX (175 g)
За нормализиране на остри нарушения на храносмилането/абсорбцията в стомашно-чревния тракт

39

PROBIOTIC PASTE (50 g)
Млечно-кисели бактерии. За възстановяване на нормалното храносмилане

40

CAT MALT (50 g)
Предотвратява космени топки в стомаха и стимулира апетита

40

TRIM DOWN PASTE (50 g)
За намаляване на усвояването на мазнини от храната при наднормено тегло

40

Кожа и козина

DERM OMEGA 3 + 6 + 9 капсули (кутия 4 x 10 капсули)
При суха кожа, слаб растеж на козината, кожни раздразнения, пърхот, сърбеж и други

41

DERM OMEGA 3 + 6 + 9 суспензия (250 ml)
При суха кожа, слаб растеж на козината, кожни раздразнения, пърхот, сърбеж и други

41

Стави и мобилност

FLEXON PASTE (180 g)
При скованост, куцота, болезненост, тежка физическа подготовка или старост

42

FLEXON COLLAGEN + (250 g)
Подпомага здравето на ставите и възстановява подвижността

42

Имунитет

DIALYSIN PASTE (50 g)
L-лизин за имунна система, дихателните пътища и нормалната функция на окото

43

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

VEPCO

Уринарен тракт

UROLSYN PASTE GEL (50 g)
Намаляване на риска от образуване на нови струвитни камъни чрез подкисляване на пикочната киселина

43

Черен дроб

DIAHEP PASTE (30 ml)
За подпомагане функцията на черния дроб и метаболитната функция

43

Витамини и минерали

B COMPLEX (130 табл.)
Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B3; Vitamin B5 ; Натрий; Калции и Фосфор

44

KA VITAL (15 табл.)
Vitamin K3 - 30 mg в таблетка

44

VITAMIN C (90 табл.)
Vitamin C 7 mg в таблетка

44

VITAMIN & MINERAL TABLETS + HERBS (90 табл.)
Против линене и поява на пърхот, за здрави кости, стави, зъби, както и здрава и блестяща козина

45

KANAVIT CALCIUM & TRACE MINERALS (100 табл.)
За поддържане на костите, ставите и подобряване на двигателната способност

45

KANAVIT – VITAMIN & MINERAL (100 табл.)
За предотвратяване на пърхот, както и за подпомагане на здрави кости, стави, зъби, както и за здрава и лъскава козина

46

PROTEVIT 37 (150 g)
Съдържа витамини, минерали, незаменими мастни киселини и протеини

46

VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6 (50 g)
Енергия за малки котенца и бременни или кърмещи котки. Стимулира апетита и е подходящ за котки, които са боледували или поради други причини имат намален апетит

47

VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6 (50 g)
Енергия за малки кученца, бременни или кърмещи кучки. Стимулира апетита и е подходящ за кучета, които са боледували или поради други причини имат намален апетит

47

VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6 (100 g)
Енергия за малки кученца, бременни или кърмещи кучки. Стимулира апетита и е подходящ за кучета, които са боледували или поради други причини имат намален апетит

47

LACTIC TABLETS OMEGA FISH (100 табл.)
Омега рибен вкус. Вкусен, с висока биологична стойност, богат на Vitamin B, микроелементи и протеини, придава красиво гъста и лъскава козина

48

Млекозаместители

LACTI KITTEN (300 g)
Сухо мляко за котенца

48

LACTI PUPPY (500 g)
Сухо мляко за кученца

48

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

VEPCO

Поведенчески и антистрес

DIACALM TABLETS (30 табл.)
При стресови ситуации, като: пътуване, нова среда, фойерверки, гръмотевични бури и т.н.

49

DIACALM PASTE (30 ml)
При стресови ситуации, като: пътуване, нова среда, фойерверки, гръмотевични бури и т.н.

49

Екзотични и декоративни животни
Зайци и гризачи

VITAMIN SYRUP ЗА ЗАЙЦИ И ГРИЗАЧИ (15 ml)
Хранителни вещества и витамини за здраве, имунитет и жизненост

50

DIGEST BALANCE ЗА ЗАЙЦИ И ГРИЗАЧИ (15 ml)
При стомашни разстройства, свързани със стрес и промени в средата

50

LIQUID MINERALS ЗА ЗАЙЦИ И ГРИЗАЧИ (15 ml)
За подобряване качеството на водата чрез осигуряване на важни минерали

51

VITAMIN C PULVIS ЗА МОРСКИ СВИНЧЕТА (50 g)
Vitamin C 100 mg в 3,5 g pulvis

51

VITAMIN C ЗА МОРСКИ СВИНЧЕТА (15 ml)
Витамин C 35 000 g в kg

51

Екзотични и декоративни животни
Птици и влечуги

VITAMIN SYRUP ЗА ПТИЦИ (15 ml)
За подкрепа на общото здравословно състояние и имунната система и насърчаване на пеенето

52

DIGEST BALANCE ЗА ПТИЦИ (15 ml)
При стомашни разстройства, причинени от стрес, грип, промяна на клетка/околна среда, климатични вариации и т.н.

52

LIQUID MINERALS ЗА ПТИЦИ (15 ml)
За подобряване качеството на водата чрез осигуряване на важни минерали

52

MOULT SUPPORT ЗА ПТИЦИ 15 ml)
По време на периода на линеене. Подпомага поддържането на перата и общото здраве

53

VITAMIN & MINERAL ЗА ПТИЦИ И ВЛЕЧУГИ (75 g)
Важни витамини и минерали

53

ДЕРМОКОЗМЕТИКА И ХИГИЕНА

VEPCO

Шампоани
Дерматологични шампоани

CHLORHEX 0,5 % SHAMPOO (150 ml)
Хлорхексидин 0,5 %

54

CHLORHEX 4% SHAMPOO (150 ml)
Хлорхексидин 4 %

54

DANDRUFF SHAMPOO (150 ml)
Шампоан за кучета и котки с пърхот

55

BENZOYLIC PEROXIDE SHAMPOO (150 ml)
Шампоан, осигуряващ подхранване на животни с мазна кожа

55

ДЕРМОКОЗМЕТИКА И ХИГИЕНА

VEPCO

Шампоани
Козметични шампоани

MILD & SENSITIVE SHAMPOO (150 ml)
Изключително мек и подхранващ шампоан за домашни любимци с чувствителна кожа
56

2 IN 1 SHAMPOO (250 ml)
Шампоан с балсам
56

DOG SHAMPOO (250 ml)
Шампоан за всички породи кучета, хидратиращ с грижа за козината и кожата
56

CAT SHAMPOO (250 ml)
Шампоан за всички котки, хидратиращ с грижа за козината и кожата
57

CONDITIONER (250 ml)
Балсам за плътна и лесна за разресване козина
57

VEPCO SHAMPOO (500 ml)
Специален шампоан инспириран от шампоан за коне
57

Лосиони за уши

EAR CLEANER (50 ml)
Разтваря мръсотията и ушната кал, облекчава раздразненията в ухото
58

EAR CLEANER (50 ml)
Разтваря мръсотията и ушната кал, облекчава раздразненията в ухото
58

EAR CLEANER (100 ml)
Разтваря мръсотията и ушната кал, облекчава раздразненията в ухото
58

Разтвори за очи

EYE CLEANER (50 ml)
При люспи и мръсотия около очите за всички животни
58

EYE CLEANER (100 ml)
При люспи и мръсотия около очите за всички животни
58

Устна хигиена и профилактика

ORAFITAL (50 ml)
Спрей за устна хигиена.
Намалява плаката и бактериите, освежава дъха и защитава венците
59

TOOTH PASTE HERBAL (75 g)
Паста за зъби с билки
59

TOOTH PASTE ENZYME (75 g)
Паста за зъби с ензими
59

OROZYME GEL (70 g)
Гел с ензимен комплекс за устна хигиена за разграждането на плаката и контрола на бактериите.
60

OROZYME ENZYME STRIPS S (244 g) | M (141 g) | L (141 g)
Ензимни колагенови ленти като лакомство за малки, средни и едри породи кучета
60

Локална грижа за кожа и рани
Спрейове

VIOCID SPRAY (200 ml)
Chlorhexidine gluconate + Methylrosaline chloride
Антисептичен спрей за локални кожни лезии и рани
61

ДЕРМОКОЗМЕТИКА И ХИГИЕНА

VEPCO

Локална грижа за кожа и рани
Спрейове

DERMAZYM SPRAY (200 ml)
Trypsin + Peru balsam + Castor oil
Ускорява заздравяването на рани, язви и абсцеси с минимални белези
61

ALUDERM SPRAY (200 ml)
Алуминиев филмообразуващ спрей за защита на кожата от замърсявания и неблагоприятни външни влияния
61

PUDERM SPRAY (200 ml)
Микрофин прахообразен подсушаващ спрей за чувствителни кожни участъци. Подпомага регенерацията
62

BLUEDERM SPRAY (200 ml)
Масло от риган, декспантенол, полисорбат,синя оцветяваща смес. За увредена и чувствителна кожа
62

ZINCODERM SPRAY (200 ml)
Алантоин, ланолин, цинков оксид
Спрей с унгвентна основа за защита и регенерация на кожата
62

PODODERM SPRAY (200 ml)
Черен маслен спрей с филмообразуващо действие за поддръжка и защита на роговите тъкани
63

CHLORHEXIDINE SPRAY (50 ml)
Спрей с хлорхексидин за почистване и дезинфекция на кожата при драскотини и малки рани
63

Локална грижа за кожа и рани
Лосиони

SENSI LOTION (50 ml)
Лосион за чувствителна и раздразнена кожа.
Подходящ при леки изгаряния и след ухапвания от насекоми
63

Локална грижа за кожа и рани
Мехлеми и гелове

ZINC + LAVENDER (100 g)
Мехлем с цинк и лавандула. Възстановява и заздравява кожата
64

SPOROZON (80 g)
Крем след лечение на дерматомикози и лишеи за подпомагане на регенерацията на кожата
64

GREEN PLUS GEL (100 g)
Масажен гел с ментол, евкалипт и камфор
64

Поведение и обучение

BITTER SPRAY (100 ml)
Горчив спрей против облизване и гризане на рани, козина, пера и превръзки
65

GO AWAY SPRAY (100 ml)
Отблъскващ спрей. Ограничава достъпът и замърсяването от кучета и котки
65

CATNIP SPRAY (100 ml)
Атрактант с валериана. Ароматен спрей с привличащ ефект при котки
65

BITCH SPRAY (100 ml)
Спрей за намаляване на нежеланото внимание от мъжки кучета по време на разгонване
66

ДЕРМОКОЗМЕТИКА И ХИГИЕНА

VEPCO

Поведение и обучение

Разтвори

FORESKIN CLEANER (100 ml)
Готов разтвор за почистване на препуциума и гънките около него



66

Грижа за лапите

PAW SPRAY (50 ml)
Защита за лапите и възглавничките.
При горещи, хлъзгави и неравни терени, сол, лед и чакъл



67

PAW WAX (50 g)
Протективна вакса за лапите и възглавничките



67

PAW BALM (15 ml)
Предпазващ балсам за възглавничките



67

КЛИНИКА И КОНСУМАТИВИ

VEPCO

Кръвоспиращи средства

DIASTOP BLOOD STOP
Кръвоспиращ продукт при подрязване на нокти и повърхностни рани



68

Дезинфекция и хигиена

UDDERCREAM (250 ml)
Крем с пчелен восък за суха кожа и напукани цицки



68

ODEURLESS SPRAY (500 ml)
За за отстраняване на лоши миризми в клиниката или двора



68

Лубриканти и диагностични гелове

LUBRICATION GEL (500 ml | 1000 ml)
Лубрикиращ гел за ректални и вагинални изследвания и при раждане



69

ULTRASOUND GEL (250 ml)
Високовискозен гел за диагностична ехография



69

CATHETER LUBRICATION GEL (250 ml)
Аспермициден лубрикиращ гел за катетеризация и изкуствено осеменяване



69

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

VEPCO

Микрочипове за кучета и котки

МИКРОЧИП (1,4x8mm | 2,12x12mm)
Амигриращи микрочипове с малък и стандартен размер



70

Паспорти и подвързии

EURO ПАСПОРТ
Паспорт със структурна (релефна) и твърда корица с обли краища за по-малък риск от фалшификация



70

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Паспорти и подвързии

ЗДРАВНА КНИЖКА 71
Здравна книжка за вписване на ваксинации, обезпаразитяване и манипулации

ПАСПОРТ ЗА ДЕКОРАТИВЕН ЗАЕК 71
Паспорт с практична информация за грижи, вписване на ваксинации, обезпаразитяване и манипулации

PVC ПРОЗРАЧНА ПОДВЪРЗИЯ ЗА ПАСПОРТ 71
За подвързване на паспорт или здравна книжка.
С възможност за отпечатване по Ваш дизайн

Ушни марки / табели за кошери

УШНИ МАРКИ ЗА ДПЖ 72
Електронни ушни марки за дребни преживни животни

УШНИ МАРКИ ЗА ЕПЖ 72
За първоначална идентификация на едри преживни животни

КЛЕЩИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ 72
Универсални. Със сменяем щифт в зависимост от модела ушни макри

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА КОШЕР 73
За идентификация на пчелни семейства (кошери)

PEST CONTROL

Родентициди

RATOSTOP PASTA (150 g | 2 kg) 74
Родентицидна примамка под формата на паста.
Бродифакум 0.0025 g + Денатониум бензоат 0,001 g в 100 g

RATOSTOP BLOCKS (40 g | 2 kg) 74
Родентицидна примамка под формата на блокчета.
Бромадиолон (N°CAS 28772-56-7) 0,0025 g в 100 g

RATOSTOP ЛЕПИЛО (135 g) 74
Лепило за плъхове и мишки с дълготрайна лепкавост

Инсектициди

VEPCO 10EC (20 ml | 250 ml | 1000 ml) 74
Циперметрин 10 %. Течен инсектицид за разтваряне във вода

VEPCO POWDER (80 g) 74
Циперметрин 0.25 g / 100 g. Прахообразен инсектицид за поръсване



INSPECTOR QUADRO TABS

таблетка за котки и кучета с тегло > 0,5 - 2 kg:
Lufenuron 20 mg + Moxidectin 0,6 mg + Praziquantel 10 mg
таблетка за котки и кучета с тегло > 2 - 8 kg:
Lufenuron 40 mg + Moxidectin 1,2 mg + Praziquantel 20 mg
таблетка за котки и кучета с тегло > 8 - 16 kg:
Lufenuron 160 mg + Moxidectin 4,8 mg + Praziquantel 80 mg
таблетка за кучета с тегло > 16 kg:
Lufenuron 320 mg + Moxidectin 9,6 mg + Praziquantel 160 mg

Кутия 2 x 2 таблетки

листовка

Inspector QUADRO TABS е предназначен за възрастни кучета и котки, кученца и котенца за лечение и профилактика на инвазии от кръвосмучещи насекоми, демодекозна краста, заразяване с ушни акари, саркоптозна краста, нотоедрозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза, трихуроза), цестодози (инвазии с тения, дипилидиоза, ехинококоза, дифилоботриоза, мезоцестоидоза), комплексни нематодно-цестодни инвазии, както и за профилактика на дирофилариоза. Комбинацията от луфенурон, моксидектин и празиквантел, осигурява широк спектър от антипаразитно действие срещу всички стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis)*, саркоптидни кърлежи (*Otodectes cynotis, Sarcoptes canis, Notoedres cati*), демодекозни акари (*Demodex canis*), иксодидни кърлежи (*Dermacentor spp., Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), кръгли червеи и тении, паразитиращи в стомашно-чревния тракт при кучета и котки, включително T*oxocara canis, Toxocara cati* (*Toxocara mystax*), *Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, Multiceps multiceps*, както и ларвения стадий на развитие на *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Inspector QUADRO TABS се прилага индивидуално, перорално, със сутрешно хранене с малко количество храна или принудително в основата на езика след хранене в минимална терапевтична доза от 10 mg луфенурон, 5 mg празиквантел и 0.3 mg моксидектин на 1 kg телесна маса по следния начин:

	Inspector QUADRO TABS съдържа в 1 таблетка: луфенурон/моксидектин/празиквантел			
Телесна маса	за котки и кучета 0.5 - 2 kg	за котки и кучета 2- 8 kg	за котки и кучета 8 - 16 kg	за кучета над 16 kg
	20 mg/0.6 mg/10 mg	40 mg/1.2 mg/20 mg	160 mg/4.8 mg/80 mg	320 mg/9.6 mg/160 mg
0.5 - 1 kg	½ таблетка	-	-	-
>1 – 2 kg	1 таблетка	-	-	-
>2 – 4 kg	-	1 таблетка	-	-
>4 – 8 kg	-	2 таблетки	-	-
>8 – 16 kg	-	-	1 таблетка	-
>16 – 32 kg	-	-	-	1 таблетка
>32 – 48 kg	-	-	-	1+½ таблетка
>48 - 64 kg	-	-	-	2 таблетки

Съвет за правилно приложение
След еднократно приложение на продукта антипаразитният му ефект продължава до 5 седмици. Продължителността на инсектоакарицидния ефект на продукта зависи от индивидуалните характеристики на животното (степен на активност, състояние на кожата и козината, възраст на животното, характеристики на метаболизма, хранене и др.) и дозата от продукта. При заразяване с бълхи, кърлежи или отодектоза на кучета и котки, INSPECTOR QUADRO TABS се използва еднократно, за предотвратяване на повторна инвазия веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразитите. Инсектицидният ефект на продукта се проявява след 24 часа, достигайки максимално ниво след 48 часа. Като се има предвид, че акарицидният ефект на продукта се проявява за 12-24 часа след приложението, третиранията трябва да се извършват не по-късно от 24 часа преди очакваното пускане на животното на открити места, където има вероятност от наличие на кърлежи (паркове, градини, гори). За унищожаване на ектопаразити в помещението и предотвратяване на повторно заразяване на животните, развъдниците, клетките, постелките и одеялата се третират с разрешен за употреба инсектоакарициден продукт в съответствие с инструкцията за употреба. Когато животните са засегнати от саркоптозна, нотоедрозна или демодекозна краста, третирането се провежда два до пет пъти с интервал от 7 до 14 дни преди клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава от два отрицателни резултата от изследвания за акари. Лечението на животни се препоръчва да се извършва в комплекс с използването на патогенетични и симптоматични продукти. При хелминтоза продуктът се използва за терапевтични цели еднократно според показанията; при силна степен на инвазия се препоръчва повторение на третирането след 10 до 14 дни. За превантивни цели продуктът се използва в терапевтична доза веднъж на всеки 3 месеца, както и 10 до 14 дни преди всяка ваксинация. За предотвратяване на дирофилариоза в засегнатите от болестта райони, продуктът се прилага през пролетно-лятно-есенния период: преди началото на летене на комарите (носители на D. immitis) еднократно, след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на насекомите. INSPECTOR QUADRO TABS не унищожава зрели дирофиларии, но намалява броя на микрофилариите, циркулиращи в кръвта и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.



INSPECTOR QUADRO C

Всеки ml съдържа: Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 26,75 mg

Spot-on за кучета с тегло:

> 1-4 kg | > 4-10 kg | > 10-25 kg | > 25-40 kg | > 40-60 kg

Кутия 1 пипета

листовка

INSPECTOR QUADRO C е предназначен за кучета и кученца за лечение и профилактика на инвазии от кръвосмучещи насекоми, демодекозна краста, заразяване с ушни акари, саркоптозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза), цестодози (инвазии с тении, дипилидиоза, ехинококоза), комплексни нематодно-цестодни инвазии, както и за профилактика на дирофилариоза. Комбинацията от фипронил, празиквантел, моксидектин и пирипроксифен, които са част от продукта, осигурява неговия широк спектър на антипаразитно действие срещу бълхи (*Ctenocephalides canis*), смучещи въшки (*Linognathus setosus*), въшки (*Trichodectes canis*), саркоптидни кърлежи (*Sarcoptes scabiei, Otodectes cynotis*), демодекозни кърлежи (*Demodex canis*) и иксодидни кърлежи (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.); ларвна и зряла фаза на нематодно развитие на *Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala*; цестоди (*Taenia* spp., *Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum*), ларви (микрофиларии) на *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*, паразитиращи при кучета.

Дозировка, начини и метод на приложение

INSPECTOR QUADRO C се използва при кучета, като се прилага върху суха, здрава кожа, в дозите, посочени в таблицата:

Телесна маса (т.м.)	Доза на продукта (номиналния обем на пипетата), ml
1-4 kg	0,4
4-10 kg	1,0
10-25 kg	2,5
25-40 kg	4,0
40-60 kg	6,0

Съвет за правилно приложение

При лечение на кучета с телесна маса над 60 kg, продуктът се прилага в доза от 0,1 ml/kg телесна маса, като се използва комбинация от пипети от различни опаковки. При лечение на кучета с телесна маса под 1 kg продуктът се прилага в доза от една капка разтвор (0.05 ml) на 0.5 kg телесна маса. За да се елиминират бълхи, смучещи въшки, въшки и иксодидни кърлежи, приложете продукта (прилагане върху ограничен участък) директно върху кожата на места, недостъпни за животно за облизване – между лопатките в основата на шията. При третиране на големи кучета, приложете съдържанието на пипетата на 3-4 места. Третирайте животните веднъж, за да предотвратите повторна инвазия. Третирайте веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразити. За да предотвратите повторна инвазия на бълхи, заменете или третирайте постелките на животните с одобрени инсектициди в съответствие с инструкциите за употреба.

Акарицидният ефект на продукта се проявява след 12-24 часа, като се има предвид, че третирането трябва да се извърши не по-късно от 24 часа преди очакваното пускане на животно на открити места, където има вероятност да бъдат изложени на кърлежи (паркове, градини, гори). За да се премахнат иксодидните кърлежи, прикрепени към тялото на животно, нанесете 1 капка INSPECTOR QUADRO C на кърлеж в мястото на прикрепването му към кожата. Ако в продължение на 20 минути кърлежът не падне спонтанно, внимателно го отстранете от кожата с пинсета и унищожете. За лечение на отодектоза, почистете ушния канал от струпеи и корички, след това приложете във всяко ухо по 3-5 капки от продукта (необходимо е накапване и в двете уши), сгънете ушната раковина наполовина и масажирайте основата. Останалият продукт от използваната пипета (спрямо т.м. на животното) се прилага върху кожата между лопатките. Извършете 2-3 третирания с интервал от 7-10 дни. В случай на усложнение на отит се прилагат антимикробни и противовъзпалителни продукти. Ако е необходимо, повторете курса на лечение след 1 месец при микроскопски контрол. Ако тъпанчевата мембрана е перфорирана, нанесете продукта върху кожата, между лопатките в основата на шията в дозите, посочени в таблицата. В случай на саркоптозна и демодекозна краста, приложете INSPECTOR QUADRO C в тънък слой върху местата на тялото след почистване от струпеи, покривайки границата на здрава кожа до 1 cm^2 в доза от 0,1 ml/kg телесна маса. Извършете 2-4 третирания с интервал от 7-10 дни. Третирайте животни с обширни лезии на два етапа с интервал от 1 ден, като прилагате продукта върху засегнатите области първо върху едната и след това върху другата половина на тялото. Препоръчва се лечението да се провежда комплексно, като се използват патогенетична и симптоматична терапия, до клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава с два отрицателни резултата от микроскопски изследвания. За дехелминтизиране на животните приложете INSPECTOR QUADRO C върху кожата в дозите, посочени в таблицата, за терапевтични цели - еднократно, а за превантивна цел - веднъж месечно. За предотвратяване на дирофилариоза в засегнатите от болестта райони, прилагайте продукта през пролетно-лятно-есенния период: преди началото на летене на комарите (носители на D. immitis) веднъж, след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на насекомите. INSPECTOR QUADRO C не унищожава зрели дирофиларии, но намалява броя на микрофилариите, циркулиращи в кръвта, и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.



INSPECTOR QUADRO K

Всеки ml съдържа: Fipronil 107 mg + Praziquantel 42,8 mg + Pyriproxyfen 21,4 mg + Moxidectin 10,7 mg

Spot-on за котки с тегло: > 1-4 kg | > 4-8 kg | > 8-15 kg

Кутия 1 пипета

листовка

INSPECTOR QUADRO K е предназначен за котки и котенца за лечение и профилактика на инвазии от кръвосмучещи насекоми, заразяване с ушни акари, нотоедрозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза), цестодози (инвазии с тении, дипилидиоза, алвеококоза), както и за профилактика на дирофилариоза. Комбинацията от фипронил, празиквантел, моксидектин и пирипроксифен, които са част от продукта, осигурява неговия широк спектър на антипаразитно действие срещу бълхи (*Ctenocephalides felis*), въшки (*Felicola subrostratus*), саркоптидни кърлежи (*Notoedres cati, Otodectes cynotis*) и иксодидни кърлежи (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.), ларвни и зрели фази на нематодно развитие на *Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala*, цестоди (*Taenia* spp., *Alveococus multilocularis*, *Dipylidium caninum*), ларви (микрофиларии) на *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*, паразитиращи при котки.

Дозировка, начини и метод на приложение:
INSPECTOR QUADRO K се използва при котки, като се прилага върху суха, здрава кожа, в дозите, посочени в таблицата:

Телесна маса (т.м.)	Доза на продукта (номиналния обем на пипетата), ml
1-4 kg	0,4
4-8 kg	0,8
8-15 kg	1,5

Съвет за правилно приложение
При лечение на котки с тегло над 15 kg, продуктът се прилага в доза от 0,1 ml/kg телесна маса, като се използва комбинация от пипети от различни опаковки. При лечение на котки с телесна маса под 1 kg, продуктът се прилага в доза от една капка разтвор (0.05 ml) на 0.5 kg телесна маса. За да се елиминират бълхи, смучещи въшки, въшки и иксодидни кърлежи, приложете продукта (прилагане върху ограничен участък) директно върху кожата на места, недостъпни за животно за облизване – между лопатките в основата на шията. При третиране на големи котки, приложете съдържанието на пипетата на 3-4 места. Третирайте животните веднъж, за да предотвратите повторна инвазия. Третирайте веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразити. Акарицидният ефект на продукта се проявява след 12-24 часа, като се има предвид, че третирането трябва да се извърши не по-късно от 24 часа преди очакваното пускане на животно на открити места,
където има вероятност да бъдат изложени на кърлежи (паркове, градини, гори). За да се премахнат иксодидните кърлежи, прикрепени към тялото на животно, нанесете 1 капка INSPECTOR QUADRO K на кърлеж в мястото на прикрепването му към кожата. Ако в продължение на 20 минути кърлежът не падне спонтанно, внимателно го отстранете от кожата с пинсета и унищожете. За лечение на отодектоза, почистете ушния канал от струпеи и корички, след това приложете във всяко ухо по 3-5 капки от продукта (необходимо е накапване и в двете уши), сгънете ушната раковина наполовина и масажирайте основата. Останалият продукт от използваната пипета (спрямо т.м. на животното) се прилага върху кожата между лопатките. Извършете 2-3 третирания с интервал от 7-10 дни. В случай на усложнение на отит се прилагат антимикробни и противовъзпалителни продукти. Ако е необходимо, повторете курса на лечение след 1 месец при микроскопски контрол. Ако тъпанчевата мембрана е перфорирана, нанесете продукта върху кожата, между лопатките в основата на шията в дозите, посочени в таблицата.
В случай на нотоедрозна краста, приложете INSPECTOR QUADRO K в тънък слой върху местата на тялото след почистване от струпеи, покривайки границата на здрава кожа до 1 cm^2 в доза от 0,1 ml/kg телесна маса. Извършете 2-4 третирания с интервал от 7-10 дни. Третирайте животни с обширни лезии на два етапа с интервал от 1 ден, като прилагате продукта върху засегнатите области първо върху едната и след това върху другата половина на тялото. Препоръчва се лечението да се провежда комплексно, като се използват патогенетична и симптоматична терапия, до клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава с два отрицателни резултата от микроскопски изследвания. За дехелминтизиране на животните приложете INSPECTOR QUADRO K върху кожата в дозите, посочени в таблицата, за терапевтични цели – еднократно, а за превантивна цел - веднъж месечно. За предотвратяване на дирофилариоза в засегнатите от болестта райони, прилагайте продукта през пролетно-лятно-есенния период: преди началото на летене на комарите (носители на D. immitis) веднъж, след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на насекомите. INSPECTOR QUADRO K не унищожава зрели дирофиларии, но намалява броя на микрофилариите, циркулиращи в кръвта и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.



ALPRAMIL DOG

Таблетка делима на 4 за кучета > 0,5 - 10 kg:
Milbemycin oxime 5 mg + Praziquantel 50 mg
Таблетка кучета > 5 - 25 kg:
Milbemycin oxime 12,5 mg + Praziquantel 125 mg
Таблетка кучета > 8 - 40 kg:
Milbemycin oxime 20 mg + Praziquantel 200 mg

Кутия 10 x 4 таблетки

листовка

Лечение на смесени инфекции от възрастни цестоди и нематоди на следните видове, чувствителни към празиквантел и милбемицин оксим:

- Цестоди:

Dipylidium caninum, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*

- Нематоди:

Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis Crenosoma vulpis (Намаляване на нивото на инфекция), *Angiostrongylus vasorum* (Намаляване на нивото на инфекцията от незрели възрастни (L5) и възрастни паразитни стадии; вижте специфични схеми за лечение и профилактика на заболяванията в раздел "Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение"), *Thelazia callipaeda* (виж специфичната схема на лечение в раздел "Дозировка, начини и метод на приложение") Продуктът може да се използва и за профилактика на дирофилариоза (*Dirofilaria immitis*), ако е показано съпътстващо лечение срещу цестоди.

Дозировка, начини и метод на приложение

Перорално приложение. Минимална препоръчвана доза: 0,5 mg милбемицин оксим и 5 mg празиквантел на kg се прилага веднъж перорално. Продуктът трябва да се прилага по време или след хранене. Животните трябва да бъдат претеглени, за да се гарантира точното дозиране. В зависимост от телесната маса на кучето и концентрацията на таблетките, практическите примери за дозиране са както следва:

Таблетки от 5 mg/50 mg:

Тегло kg	5 mg/50 mg таблетки	
0,5 - 2,5		1/4 таблетка
> 2,5 - 5		1/2 таблетка
> 5 - 10		1 таблетка
> 10 - 15		1 1/2 таблетки

Таблетки от 12,5 mg/125 mg:

Тегло kg	12,5 mg/125 mg таблетки	
> 5 - 25		1 таблетка
> 25 - 50		2 таблетки

Таблетки от 20 mg/200 mg:

Тегло kg	20 mg/200 mg таблетки	
> 8 - 40		1 таблетка
> 40 - 80		2 таблетки

В случаите, когато се използва за профилактика на дирофилариоза и в същото време се изисква лечение срещу цестоди, продуктът може да замени моновалентния продукт за профилактика на дирофилариоза. За лечение на инфекции с Angiostrongylus vasorum милбемицин оксим трябва да се прилага четири пъти на седмични интервали. Препоръчва се, когато е показано съпътстващо лечение срещу цестоди, да се лекува веднъж с продукта и да се продължи с моновалентния продукт, съдържащ милбемицин оксим самостоятелно, за останалите три седмици от лечението. В ендемични зони приложението на продукта на всеки четири седмици ще предотврати ангиосторонгилоза чрез намаляване на тежестта на незрели възрастни (L5) и възрастни паразити, където е показано съпътстващо лечение срещу цестоди. За лечение на Thelazia callipaeda милбемицин оксим трябва да се прилага двукратно, с интервал от седем дни. Когато е показано едновременното лечение срещу цестоди, продуктът може да замени моновалентния продукт, съдържащ само милбемицин оксим.



ALPRAMIL CAT

Филмирани табл. делими на 2 за котки > 0,5 - 2 kg:
Milbemycin oxime 4 mg + Praziquantel 10 mg
Филмирани таблетки котки > 3 - 6 kg:
Milbemycin oxime 12 mg + Praziquantel 30 mg
Филмирани таблетки котки > 4 - 8 kg:
Milbemycin oxime 16 mg + Praziquantel 40 mg

Кутия 10 x 4 таблетки

листовка

Лечение на смесени инфекции от незрели и възрастни цестоди и нематоди от следните видове:

- Цестоди:
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Echinococcus multilocularis
- Нематоди:
Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati

Профилактика на дирофилариоза (*Dirofilaria immitis*), ако е показано съпътстващо лечение срещу цестоди.

Дозировка, начини и метод на приложение
Перорално приложение. Минимална препоръчвана доза: 2 mg милбемицин оксим и 5 mg празиквантел на kg се прилага перорално като еднократна доза. Животните трябва да бъдат претеглени, за да се гарантира точното дозиране. В зависимост от телесната маса на котката и концентрацията на таблетките, практическите примери за дозиране са както следва:

Таблетки от 4 mg/10 mg

Тегло kg	4 mg/10 mg таблетки	
0.5 - 1		1/2 таблетка
> 1 - 2		1 таблетка
> 2 - 3		1 1/2 таблетки
> 3 -4		2 таблетки

Таблетки от 12 mg/30 mg:

Тегло kg	12 mg/30 mg таблетки	
> 3 - 6		1 таблетка
> 6 -12		2 таблетки

Таблетки от 16 mg/40 mg:

Тегло kg	16 mg/40 mg таблетки	
> 4 - 8		1 таблетка
> 8 -16		2 таблетки







DIHELVET TABLETS

Таблетки делими на 4 за кучета и котки:

Pyrantel pamoate	150 mg
Praziquantel	50 mg
Ivermectin	0,06 mg

Кутия 1 х 10 таблетки

листовка

За лечение и предпазване от инвазии с нематоди и цестоди на гастроинтестиналния тракт, както и за предпазване от дирофилариоза.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

В случаи на цестодни и нематодни инфекции на гастроинтестиналния тракт с лечебна и профилактична цел таблетките трябва да се прилагат индивидуално, перорално, еднократно при сутрешното хранене с неголямо количество храна или принудително, поставени непосредствено на дъното на езика, в доза от 1 таблетка на 10 kg телесна маса. С профилактична цел трябва да се прилага на всеки три месеца и преди всяка ваксинация. За редуциране на циркулиращите микрофиларии при животните, инвазирани с Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens, продукта се прилага еднократно, веднъж в месеца. С цел предпазване от дирофилариоза в райони с висок риск от възникване на заболяване, DIHELVET TABLETS се прилага пролетно-лятно-есенния период: веднъж преди започване на сезона на комарите (март-април), след това ежемесечно от април до октомври и за последен път един месец след края на сезона на комарите (октомври-ноември).

INSECTAL COLLAR

Противопаразитна каишка за кучета и котки 40 см:
Fipronil 0,73 g + Pyriproxyfen 0,29 g
Противопаразитна каишка за кучета 65 см:
Fipronil 1,29 g + Pyriproxyfen 0,52 g
Противопаразитна каишка за кучета 75 см:
Fipronil 2,59 g + Pyriproxyfen 1,03 g


1 каишка

листовка

Контрол на инвазии със зрели и ларвни стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis*), смучещи въшки (*Linognathus setotus*), въшки (*Trichodectes canis, Felicola subrostratus*), иксодидни кърлежи (*Ixodidae*) при кучета и котки.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

След отваряне на опаковката разгънете нашийника и го поставете върху врата животното, регулирано по размер по такъв начин, че между шията на животното и нашийника да остане разстояние между 1.0 и 1.5 cm, след това фиксирайте закопчалката и отрежете излишната част от нашийника.





CLAVUSAN

Таблетки делими на 4 за кучета и котки:
Amoxicillin 50 mg + Clavulanic acid 12,5 mg/таблетка
Amoxicillin 250 mg + Clavulanic acid 62,5 mg/таблетка
Amoxicillin 500 mg + Clavulanic acid 125 mg/таблетка

Кутия 10 x 10 таблетки

листовка

За лечение на инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към амоксицилин и клавуланова киселина, включващи: кожни заболявания (включително дълбоки и повърхностни пиодермии); инфекции на меките тъкани (абсцеси и анален сакулит); зъбни инфекции (напр. гингивит); инфекции на пикочните пътища; дихателни заболявания (включително на горните и долните дихателни пътища); ентерит.


Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За перорално приложение.
Препоръчителната доза е 12,5 mg/kg телесна маса (10 mg амоксицилин/2,5 mg клавуланова киселина на kg телесна маса), два пъти дневно. Следната таблица е предвидена за напътствие при предписването на таблетките в препоръчителната доза. За да се гарантира правилната доза, телесната маса трябва да се определи възможно най-прецизно, за да се избегне прилагане на по-ниска доза.

	Брой таблетки два пъти дневно (дозово ниво: 12,5 mg/kg телесна маса)		
Телесна маса (kg)	Амоксицилин/ клавуланова киселина 50 mg + 12,5 mg	Амоксицилин/ клавуланова киселина 250 mg + 62,5 mg	Амоксицилин/ клавуланова киселина 500 mg + 125 mg
1-1,25	¼	-	-
>1,25-2,5	½	-	-
>2,5-3,75	¾	-	-
>3,75-5	1	-	-
>5-6,25	1¼	¼	-
>6,25-12,5	-	½	¼
>12,5-18,75	-	¾	-
>18,75-25	-	1	½
>25-31,25	-	1¼	-
>31,25-37,5	-	1½	-
>37,5-50	-	-	1
>50-62,5	-	-	1¼
>62,5-75	-	-	1½

= ¼ таблетка = ½ таблетка = ¾ таблетка = 1 таблетка

Таблетките могат да се разделят на 2 или 4 равни части, за да се гарантира точно дозиране.



Минималната продължителност на лечението е 5 дни, като в по-голямата част от рутинните случаи има отговор след лечение от 5 до 7 дни.

При хронични или рефрактерни случаи може да се наложи по-дълъг курс на терапия, напр. при хронично кожно заболяване: 10 - 20 дни, при хроничен цистит: 10 - 28 дни или респираторно заболяване: 8 - 10 дни. При такива обстоятелства общата продължителност на лечението е по преценка на лекаря, но трябва да е достатъчно голяма, за да гарантира пълно излекуване на бактериалното заболяване.



METROBACTIN

Таблетки делими на 4 за кучета и котки:
Metronidazole 250 mg /таблетка
Metronidazole 500 mg /таблетка


Кутия 10 x 10 таблетки

листовка

Лечение на инфекции на стомашно-чревния тракт, причинени от *Giardia spp*. и *Clostridium spp*. (т.е. *C. perfringens или C. difficile)*. Лечение на инфекции на урогенитални тракт, устната кухина, гърлото и кожата, причинени от облигатни анаеробни бактерии (напр. *Clostridium spp*.), чувствителни на метронидазол.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Препоръчителната доза е 50 mg метронидазол на kg телесна маса на ден, в продължение на 5-7 дни. Дневната доза може да се раздели по равно за приложение два пъти дневно (т.е. 25 mg/kg телесна маса два пъти дневно). С цел осигуряване прилагането на правилната доза е необходимо възможно най-точно определяне на телесната маса.





CLAVON

Amoxicillin 140 mg + Clavulanic acid 35 mg в ml
Инжекционна суспензия

50 ml

листовка

За лечение на мастити и респираторни инфекции, причинени от *Pasteurella multocida* и *Mannheimia haemolytica* при говеда. За лечение на инфекции на респираторния тракт, инфекции на пикочните пътища, инфекции на кожата и меките тъкани (като абсцеси, пиодермия, анален сакулит и гингивит) при кучета.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Продуктът е показан за интрамускулно приложение при говеда и подкожно приложение при кучета. Препоръчителната доза е 8,75 mg/kg телесна маса (7 mg/kg телесна маса амоксицилин и 1,75 mg/kg телесна маса клавуланова киселина) или 1 ml от продукта на 20 kg телесна маса веднъж дневно в продължение на 3-5 дни. Разклатете добре флакона преди употреба. Използвайте напълно суха стерилна игла и спринцовка. Почистете запушалката преди да изтеглите всяка доза.



CARDISAN

Дъвчащи таблетки делими на 4 за кучета:
Pimobendan 1,25 mg/таблетка
Pimobendan 2,5 mg /таблетка
Pimobendan 5 mg /таблетка
Pimobendan 10 mg/таблетка

Кутия 10 x 10 таблетки

листовка

За лечение на застойна сърдечна недостатъчност при кучета, произтичаща от дилатативна кардиомиопатия или клапна недостатъчност (митрална и/или трикуспидална клапна регургитация).


Дозировка, начини и метод на приложение
За перорално приложение.
Да не се надвишава препоръчаната доза.
За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.
Дозата се дава през устата в дозирано количество от 0,2 mg до 0,6 mg пимобендан/kg телесна маса, разделено на два приема дневно. Препоръчителната дневна доза е 0,5 mg/kg телесна маса, разделена на два приема дневно (0,25 mg/kg телесна маса на прием). Всяка доза трябва да се дава приблизително 1 час преди хранене.

Това съответства на:
Една дъвчаща таблетка от 1,25 mg сутрин и една дъвчаща таблетка от 1,25 mg вечер при телесна маса 5 kg.

Една дъвчаща таблетка от 2,5 mg сутрин и една дъвчаща таблетка от 2,5 mg вечер при телесна маса 10 kg.

Една дъвчаща таблетка от 5 mg сутрин и една дъвчаща таблетка от 5 mg вечер при телесна маса 20 kg.

Една дъвчаща таблетка от 10 mg сутрин и една дъвчаща таблетка от 10 mg вечер при телесна маса 40 kg.



В случай на застойна сърдечна недостатъчност се препоръчва лечение до края на живота. Поддържащата доза се определя индивидуално според тежестта на заболяването.





PHENOSAN TABLETS

Дъвчащи таблетки делими на 4 за кучета:
Phenobarbital 12.5 mg/таблетка
Phenobarbital 50 mg/таблетка
Phenobarbital 100 mg/таблетка

Кутия 25 x 10 таблетки

листовка

За предотвратяване на епилептични припадъци и за намаляване на честотата, тежестта и продължителността на припадъците при идиопатична епилепсия.

Дозировка, начини и метод на приложение
Перорална употреба. Препоръчителната начална доза е 2,5 mg phenobarbital на kg телесна маса, прилагана два пъти дневно, (на всеки 12 часа). За да се осигури правилна начална доза, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно. Таблетките трябва да се дават по едно и също време всеки ден, за да се постигне успешна терапия. Серумните концентрации в стабилно състояние се достигат едва 1-2 седмици след началото на лечението, поради което първоначалната ефикасност на лекарството може да варира и дозите не трябва да се увеличават през този период. Корекциите на началната доза се правят въз основа на клиничната ефикасност, концентрациите на phenobarbital в кръвта и появата на неблагоприятни реакции. Определянето на серумната концентрация на phenobarbital е от съществено значение за правилната терапия, като времето за достигане на стабилно състояние (1-2 седмици) и повишеният метаболизъм поради автоиндукция (6 седмици) трябва да се имат предвид при определяне на плана за проследяване на серумната концентрация. Концентрациите на phenobarbital, считани за терапевтично ефективни, варират от 15 до 40 µg/ml, но при повечето кучета за оптимален контрол на пристъпите е необходима серумна концентрация на phenobarbital между 25-30 µg/ml.

Поради различията в екскрецията на phenobarbital и различията в чувствителността, ефективните дози могат да варират значително при различните пациенти (от 1 mg до 15 mg/kg телесна маса два пъти дневно). В случай на недостатъчна терапевтична ефикасност, дозата може да се увеличава на стъпки от 20% наведнъж, като се извършва съпътстващо наблюдение на серумните концентрации на phenobarbital. Поради автоиндукция на чернодробните микрозомални ензими, при някои кучета полуживотът на phenobarbital може да стане по-кратък от 20 часа след хронично лечение. В тези случаи, за да се сведат до минимум терапевтично значимите колебания на серумните концентрации, може да се обмисли 8-часов интервал на дозиране. Ако припадъците не се предотвратяват по задоволителен начин и ако максималната концентрация е около 40 µg/ml, диагнозата трябва да се преразгледа и/или към протокола за лечение трябва да се добави втори антиепилептичен продукт. Плазмените концентрации винаги трябва да се тълкуват заедно с наблюдавания отговор на терапията и пълната клинична оценка, включително наблюдение за доказателства за токсични ефекти при всяко животно. Моля, имайте предвид, че тази таблица за дозиране е предназначена като ръководство за отпускане на ветеринарния лекарствен продукт в препоръчаната начална доза за всеки прием: 2,5 mg/kg. В него са посочени броят и видът на таблетките, необходими за прилагане на 2,5 mg phenobarbital на kg телесна маса за един прием.

Телесна маса	Phenosan 12,5 mg
1.25 kg	¼
2,5 kg	½
3,75 kg	¾
5 kg	1
6,25 kg	1 ¼
7,5 kg	1 ½
10 kg	2
15 kg	3
20 kg	-
25 kg	-
30 kg	-
40 kg	-
50 kg	-
60 kg	-

Телесна маса	Phenosan 50 mg
1.25 kg	-
2,5 kg	-
3,75 kg	-
5 kg	¼
6,25 kg	-
7,5 kg	-
10 kg	½
15 kg	¾
20 kg	1
25 kg	1 ¼
30 kg	1 ½
40 kg	2
50 kg	2 ½
60 kg	3

Телесна маса	Phenosan 100 mg
1.25 kg	-
2,5 kg	-
3,75 kg	-
5 kg	-
6,25 kg	-
7,5 kg	-
10 kg	¼
15 kg	-
20 kg	½
25 kg	-
30 kg	¾
40 kg	1
50 kg	1 ¼
60 kg	1 ½

= ¼ Таблетка = ½ Таблетка = ¾ Таблетка = 1 Таблетка



METAXX

Мелоксикам 5 mg/ml
инжекционен разтвор за кучета и котки

20 ml

листовка

Кучета: Облекчаване на възпалението и болката както при остри, така и при хронични мускулно-скелетни нарушения. Намаляване на следоперативната болка и възпаление в резултат на ортопедична хирургия и хирургия на меките тъкани.
Котки: Намаляване на следоперативната болка след овариохистеректомия и по-лека хирургия на меките тъкани.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Дозиране за всеки вид животно
Кучета: Мускулно-скелетни нарушения: Еднократно подкожно инжектиране на доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 0,4 ml/10 kg телесна маса). Перорална суспензия на мелоксикам за кучета може да се използва за продължаване лечението в доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса 24 часа след прилагане на инжекцията. Намаляване на следоперативната болка (за период над 24 часа): Еднократно интравенозно или подкожно инжектиране на доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 0,4 ml/10 kg телесна маса) преди операция, например по време на въвеждане в анестезия.
Котки: Намаляване на следоперативната болка: Еднократно подкожно инжектиране на доза от 0,3 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 0,06 ml/1 kg телесна маса) преди операция, например по време на въвеждане в анестезия.



METAXX

Мелоксикам 20 mg/ml
инжекционен разтвор за говеда, свине и коне

100 ml

листовка

Говеда: За употреба при остри респираторни инфекции с подходяща антибиотична терапия за намаляване на клиничните признаци при говеда. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади нелактиращи говеда. Като допълнителна терапия при лечение на остър мастит в комбинация с антибиотична терапия. За облекчаване на постоперативната болка след обезроговяване на телета.
Свине: За употреба при незаразни двигателни нарушения за намаляване на симптомите на куцота и възпаление. Като допълнителна терапия при лечение на пуерперална септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалаксия) с подходяща антибиотична терапия.
Коне: За употреба при облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични мускулно-скелетни нарушения. Намаляване на болка, свързана с колики при коне.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Говеда: Еднократно подкожно или интравенозно инжектиране на доза от 0,5 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 2,5 ml/100 kg телесна маса) в комбинация с антибиотична терапия или с перорална рехидратираща терапия, според случая.
Свине: Еднократно интрамускулно инжектиране на доза от 0,4 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 2 ml/100 kg телесна маса) в комбинация с подходяща антибиотична терапия. Ако е необходимо, повторно прилагане на мелоксикам може да се направи след 24 часа.
Коне: Еднократно интравенозно инжектиране на доза от 0,6 mg мелоксикам/kg телесна маса (т.е. 3 ml/100 kg телесна маса).



METAXX

Мелоксикам 1,5 mg/ml
перорална суспензия за кучета

50 ml

листовка

Облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични мускулно-скелетни нарушения при кучета.

Дозировка, начини и метод на приложение
Перорално приложение.
Да се прилага смесен с храна или направо в устата.

Първоначално се прилага единична доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса през първия ден. Лечението се продължава един път дневно чрез перорално прилагане (на 24 часови интервали) на поддържаща доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса.

За по-продължително лечение, когато вече е наблюдаван клиничен отговор (след ≥ 4 дни), дозата Metaxx може да се регулира до най-ниската ефективна индивидуална доза, отразявайки факта, че силата на болката и възпалението, свързвани с хронични мускулно-скелетни нарушения, може да се променя с времето.

Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 3–4 дни. Лечението трябва да се прекрати най-късно след 10 дни, ако липсва явно клинично подобрение.



METAXX

Мелоксикам 0,25 mg/таблетка
таблетки делими на 4 за котки

Кутия 9 x 10 таблетки

листовка

Облекчаване на лека до умерено силна следоперативна болка и възпаление след хирургични интервенции, например ортопедични операции и операции на меките тъкани. Облекчаване на болката и възпалението при остри и хронични мускулно-скелетни нарушения.

Дозировка, начини и метод на приложение
Перорално приложение.
Следоперативна болка и възпаление след хирургични процедури:
След първоначално лечение с подходяща инжекционна форма на мелоксикам, разрешена за котки, продължете лечението 24 часа по-късно с доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса. Пероралната последваща доза може да се прилага един път дневно (на интервали от по 24 часа) до максимум четири дни.
Остри мускулно-скелетни нарушения:
Първоначално се прилага перорално единична доза от 0,2 mg мелоксикам/kg телесна маса през първия ден. Лечението трябва да продължи веднъж дневно чрез перорално приложение (на 24-часови интервали) с доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса дотогава, докато продължават острата болка и възпалението.
Хронични мускулно-скелетни нарушения:
Първоначално се прилага перорално единична доза от 0,1 mg мелоксикам/kg телесна маса през първия ден. Лечението трябва да продължи един път дневно чрез перорално прилагане (на 24-часови интервали) на поддържаща доза от 0,05 mg мелоксикам/kg телесна маса. Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 7 дни. Лечението трябва да се прекрати най-късно след 14 дни, ако липсва явно клинично подобрение.



DORMOSTART

Medetomidine hydrochloride 1 mg/ml
инжекционен разтвор

10 ml

листовка

Кучета и котки: Седация с цел улесняване на прегледа и лечението.
Кучета: Като премедикация преди обща анестезия. Седация при леки операции.
Котки: В комбинация с кетамин за обща анестезия при малки хирургични процедури с кратка продължителност.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Кучета: интрамускулно или интравенозно приложение.
Котки: интрамускулно приложение. За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Кучета: За седация ветеринарният лекарствен продукт трябва да се прилага в доза от 750 µg медетомидин хидрохлорид интравенозно или 1000 µg медетомидин хидрохлорид интрамускулно на квадратен метър телесна повърхност, което съответства на доза от 10 - 80 µg медетомидин хидрохлорид на килограм телесна маса. Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилната доза в зависимост от телесната маса. Максималният ефект се постига в рамките на 10 – 20 минути. Клиничният ефект е дозозависим и продължава от 30 до 180 минути.

Дози на медетомидин за седация в ml и съответното количество медетомидин хидрохлорид в µg/kg телесна маса. За премедикация използвайте 50% от дозата, посочена в таблицата:

Телесна маса (kg)	i.v. - инжекция (ml)	отговаряща на (µg/kg т.м.)	i.m. - инжекция (ml)	отговаряща на (µg/kg т.м.)
2	0.12	60.0	0.16	80.0
3	0.16	53.3	0.21	70.0
4	0.19	47.5	0.25	62.5
5	0.22	44.0	0.30	60.5
6	0.25	41.7	0.33	55.0
7	0.28	40	0.37	52.9
8	0.30	37.5	0.40	50.0
9	0.33	36.7	0.44	48.9
10	0.35	35	0.47	47.0
12	0.40	33.3	0.53	44.2
14	0.44	31.4	0.59	42.1
16	0.48	30	0.64	40.0
18	0.52	28.9	0.69	38.3
20	0.56	28	0.74	37.0
25	0.65	26	0.86	34.4
30	0.73	24.3	0.98	32.7
35	0.81	23.1	1.08	30.9
40	0.89	22.2	1.18	29.5
50	1.03	20.6	1.37	27.4
60	1.16	19.3	1.55	25.8
70	1.29	18.4	1.72	24.6
80	1.41	17.6	1.88	23.5

За премедикация ветеринарният лекарствен продукт трябва да се прилага в доза от 10-40 µg медетомидин хидрохлорид на килограм телесна маса, което съответства на 0,1 – 0,4 ml продукт на 10 kg телесна маса. Точната доза зависи от използваната комбинация от продукти и от дозата на другия(ите) продукт(и). Освен това дозата трябва да бъде съобразена с вида операция, продължителността на процедурата, темперамента и теглото на пациента. Премедикация с медетомидин значително ще намали дозата на необходимите индукционни агенти и ще намали необходимите летливи упойки за поддържане на анестезия. Всички анестетици, използвани за въвеждане или поддържане на анестезията, трябва да се прилагат до постигане на резултат. Преди да използвате каквито и да било комбинации, трябва да се запознаете с продуктовата документация за другите продукти.

Котки: За умерено дълбока седация и усмиряване на котки ветеринарният лекарствен продукт трябва да се прилага в доза от 50 – 150 µg медетомидин хидрохлорид/kg телесна маса (съответстващо на 0,05 – 0,15 ml продукт/kg телесна маса). За анестезия ветеринарният лекарствен продукт трябва да се прилага в доза до 80 µg медетомидин хидрохлорид/kg телесна маса (съответстваща на 0,08 ml продукт/kg телесна маса) и 2,5 до 7,5 mg кетамин/kg телесна маса. При използване на тази доза анестезията настъпва в рамките на 3 – 4 минути и се проявява в продължение на 20 – 50 минути. При по-продължителни процедури приложението трябва да се повтори, като се използва ½ от първоначалната доза (т.е. 40 µg медетомидин хидрохлорид (съответстващо на 0,04 ml продукт/kg телесна маса) и 2,5 – 3,75 mg кетамин/kg телесна маса) или само 3,0 mg кетамин/kg телесна маса. Алтернативно, при по-продължителни процедури анестезията може да бъде удължена чрез използване на инхалаторни агенти с кислород или кислород/азотен оксид.



DEXDORMOSTART

Dexmedetomidine hydrochloride
0,5 mg/ml
инжекционен разтвор

10 ml

листовка

Неинвазивни, леко до средно болезнени процедури и прегледи, които изискват усмиряване, седация и аналгезия при кучета и котки. Дълбока седация и аналгезия при кучетата в комбинация с буторфанол за медицински и малки хирургически процедури. Премедикация на кучета и на котки преди въвеждане и поддържане на обща анестезия.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Кучета: интравенозно или интрамускулно
Котки: интрамускулно
Продуктът не е предназначен за многократно инжектиране. За да се гарантира правилната доза, телесната маса трябва да се определи възможно най-прецизно.
Дозировка за Кучета:
Дозирането на дексмедетомидин се базира на площта на тялото:
Интравенозно: до 375 µg/m² от площта на тялото. Интрамускулно: до 500 µg/m² от площта на тялото. Когато се прилага в съчетание с буторфанол (0,1 mg/kg) за дълбока седация и аналгезия, интрамускулната доза на дексмедетомидин е 300 µg/m² от площта на тялото. Дозата за премедикация на дексмедетомидин е 125–375 µg/m² от площта на тялото, приложена 20 минути преди индукция при процедури, изискващи анестезия. Дозата трябва да бъде съобразена с вида операция, продължителността на процедурата и темперамента на пациента.

Едновременното приложение на дексмедетомидин и буторфанол има седативно и обезболяващо действие, което започва не по-късно от 15 минути след прилагане. Максималното седативно и обезболяващо действие се достига до 30 минути след прилагане. Седацията трае поне 120 минути след прилагане, а аналгезията трае поне 90 минути. Спонтанното съвземане идва в рамките на 3 часа. Премедикацията с дексмедетомидин значително намалява дозата на продукта, необходима за индукция и намалява необходимостта от летлив анестетик за поддържаща анестезия. При едно клинично изследване, необходимостта от пропофол и тиопентал бе намаляла съответно с 30% и 60%. Всички анестетици, използвани за въвеждане или поддържане на анестезията, трябва да се прилагат до постигане на резултат. При едно клинично изследване, дексмедетомидинът предизвика постоперативна аналгезия в продължение на 0,5-4 часа. Тази продължителност, обаче, зависи от редица променливи величини и трябва да се прилага допълнителна аналгезия съобразно клиничната преценка. На таблиците по-долу са представени съответните дози въз основа на телесната маса. Препоръчва се използването на подходящо градуирана спринцовка, за да се осигури точно дозиране при прилагането на малки обеми.

Кучета тегло (kg)	Дексмедетомидин 125 mcg/m²		Дексмедетомидин 375 mcg/m²		Дексмедетомидин 500 mcg/m²	
	(mcg/kg)	(ml)	(mcg/kg)	(ml)	(mcg/kg)	(ml)
2-3	9.4	0.04	28.1	0.12	40	0.15
3-4	8.3	0.05	25	0.17	35	0.2
4-5	7.7	0.07	23	0.2	30	0.3
5-10	6.5	0.1	19.6	0.29	25	0.4
10-13	5.6	0.13	16.8	0.38	23	0.5
13-15	5.2	0.15	15.7	0.44	21	0.6
15-20	4.9	0.17	14.6	0.51	20	0.7
20-25	4.5	0.2	13.4	0.6	18	0.8
25-30	4.2	0.23	12.6	0.69	17	0.9
30-33	4	0.25	12	0.75	16	10
33-37	3.9	0.27	11.6	0.81	15	1.1
37-45	3.7	0.3	11	0.9	14.5	1.2
45-50	3.5	0.33	10.5	0.99	14	1.3
50-55	3.4	0.35	10.1	1.06	13.5	1.4
55-60	3.3	0.38	9.8	1.13	13	1.5
60-65	3.2	0.4	9.5	1.19	12.8	1.6
65-70	3.1	0.42	9.3	1.26	12.5	1.7
70-80	3	0.45	9	1.35	12.3	1.8
>80	2.9	0.47	8.7	1.42	12	1.9

За дълбока седация и аналгезия с буторфанол		
Кучета тегло (kg)	Дексмедетомидин 300 mcg/m² интрамускулно	
	(mcg/kg)	(ml)
2-3	24	0.12
3-4	23	0.16
4-5	22.2	0.2
5-10	16.7	0.25
10-13	13	0.3
13-15	12.5	0.35
15-20	11.4	0.4
20-25	11.1	0.5
25-30	10	0.55
30-33	9.5	0.6
33-37	9.3	0.65
37-45	8.5	0.7
45-50	8.4	0.8
50-55	8.1	0.85
55-60	7.8	0.9
60-65	7.6	0.95
65-70	7.4	1
70-80	7.3	1.1
>80	7	1.2

Дозировка за Котки: Дозата за котки е 40 µg дексмедетомидинов хидрохлорид/kg телесна маса, което се равнява на обемна доза 0,08 ml продукт/kg телесна маса, когато се използва за неинвазивни, леко до средно болезнени процедури, изискващи усмиряване, седация и аналгезия. За премедикация при котките се използва същата доза дексмедетомидин. Премедикация с дексмедетомидин значително ще намали дозата на необходимите индукционни агенти и ще намали необходимите летливи упойки за поддържане на анестезия. При клинично проучване е установено, че необходимостта за пропофол е била намалена с 50%. Всички анестетици, използвани за въвеждане или поддържане на анестезията, трябва да се прилагат до постигане на резултат. Анестезия може да се индуцира 10 минути след премедикация чрез интрамускулно прилагане на целева доза от 5 mg кетамин/kg телесна маса или чрез интравенозно приложение на пропофол. Дозировката за котки е представена на таблицата по-долу.

Котки тегло kg	Дексмедетомидин 40 mcg/kg интрамускулно	
	(mcg/kg)	(ml)
1-2	40	0.1
2-3	40	0.2
3-4	40	0.3
5-6	40	0.4
6-7	40	0.5
7-8	40	0.6
8-10	40	0.7

Очакваният седативен и обезболяващ ефект настъпва до 15 минути след прилагане и се поддържа до 60 минути след прилагане. Седацията може да се прекъсне с атипамезол. Атипамезолът не трябва да се прилага до 30 минути след приложението на кетамин.





DORMOSTOP

Atipamezole hydrochloride 5 mg/ml
инжекционен разтвор

10 ml

листовка

Обръщане на седативните ефекти на медетомидин и дексмедетомидин.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
За еднократно интрамускулно приложение. Атипамезол хидрохлорид се прилага 15-60 минути след приема на медетомидин или дексмедетомидин хидрохлорид.

Кучета: интрамускулната доза атипамезол хидрохлорид [в µg] е пет пъти по-голяма от предишната доза медетомидин хидрохлорид или десет пъти по-голяма от дозата дексмедетомидин хидрохлорид. Поради 5 пъти по-високата концентрация на активната съставка (атипамезол хидрохлорид) в този ветеринарен лекарствен продукт в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 1 mg медетомидин хидрохлорид на ml и 10 пъти по-високата концентрация в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 0,5 mg дексмедетомидин хидрохлорид, е необходим равен обем от всеки ветеринарен лекарствен продукт. Тъй като концентрацията на атипамезол хидрохлорид във ветеринарния лекарствен продукт е 50 пъти по-висока в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 0,1 mg/ml дексмедетомидин хидрохлорид, необходимият обем на ветеринарния лекарствен продукт е 5 пъти по-малък от разтвора на дексмедетомидин хидрохлорид.

Пример за дозиране при кучета:

Доза Медетомидин HCl 1 mg/ml	Доза Дексмедетомидин HCl 0.5 mg/ml	Доза Дексмедетомидин HCl 0.1 mg/ml	Доза Атипамезол HCl 5 mg/ml
40 µg/kg	20 µg/kg	20 µg/kg	200 µg/kg
= 0.04 ml/kg	= 0.04 ml/kg	= 0.2 ml/kg	= 0.04 ml/kg

Котки: интрамускулната доза атипамезол хидрохлорид [в µg] е два и половина пъти по-висока от предходна доза медетомидин хидрохлорид или пет пъти по-висока от тази на дексмедетомидин хидрохлорид доза. Поради 5 пъти по-високата концентрация на активната съставка (атипамезол хидрохлорид) в този ветеринарен лекарствен продукт в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 1 mg медетомидин хидрохлорид на ml и 10 пъти по-високата концентрация в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 0,5 mg дексмедетомидин хидрохлорид, трябва да се даде половината от обема на ветеринарния лекарствен продукт спрямо този на приложения преди това медетомидин или дексмедетомидин. Тъй като концентрацията на атипамезол хидрохлорид във ветеринарния лекарствен продукт е 50 пъти по-висока в сравнение с тази на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 0,1 mg/ml дексмедетомидин хидрохлорид, необходимият обем на ветеринарния лекарствен продукт е 10 пъти по-малък от разтвора на дексмедетомидин хидрохлорид.

Пример за дозиране при котки:

Доза Медетомидин HCl 1 mg/ml	Доза Дексмедетомидин HCl 0.5 mg/ml	Доза Дексмедетомидин HCl 0.1 mg/ml	Доза Атипамезол HCl 5 mg/ml
80 µg/kg	40 µg/kg	40 µg/kg	200 µg/kg
= 0.08 ml/kg	= 0.08 ml/kg	= 0.4 ml/kg	= 0.04 ml/kg

Времето за възстановяване се съкращава до приблизително 5 минути. Животните се раздвижват приблизително 10 минути след прилагане на ветеринарния лекарствен продукт.



PRESEDINE

Detomidine hydrochloride 10 mg/ml
инжекционен разтвор

10 ml

листовка

Седиране и обезболяване на коне и говеда при прегледи и лечение от различно естество и в ситуации, при които манипулациите ще се улеснят от прилагане на ветеринарния лекарствен продукт. За премедикация преди приложение на инжекционни или инхалационни анестетици.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Интрамускулно и интравенозно приложение. Детомидин хидрохлорид трябва да се прилага интрамускулно или бавно интравенозно в дози от 10-80 µg/kg в зависимост от степента и продължителността на необходимото седиране и обезболяване. Ефектът е по-бърз при интравенозно приложение. За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Еднократно приложение (коне и говеда)

Доза		Ефект	Продължителност на действието (часове)	Други реакции
ml/100 kg	µg/kg			
0.1-0.2	10-20	Седация	0.5-1	
0.2-0.4	20-40	Седация и обезболяване	0.5-1	Леко треперене
0.4-0.8	40-80	По-силна седация и по-добро обезболяване	0.5-2	Треперене, изпотяване, пилоерекция, мускулен тремор

Ефектът се проявява 2-5 минути след интравенозно приложение. Пълният ефект се наблюдава 10-15 минути след интравенозно приложение. Ако е необходимо, детомидин хидрохлоридът може да се прилага до обща доза от 80 µg/kg. Следните инструкции за дозировка показват различни възможности за комбиниране с детомидин хидрохлорид. Въпреки това, едновременното приложение с други ветеринарни лекарствени продукти винаги трябва да се основава на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар и трябва да се извършва, като се вземат предвид КХП на съответните продукти.

Комбинации с детомидин за повишаване на седацията или обезболяването при стоящи коне

Детомидин хидрохлорид 10 - 30 µg/kg интравенозно приложение в комбинация с:
- буторфанол 0,025-0,05 mg/kg i.v. или
- левометадон 0,05-0,1 mg/kg i.v. или
- ацепромазин 0,02-0,05 mg/kg i.v.

Комбинации с детомидин за повишаване на седацията или аналгезията при говеда

Детомидин хидрохлорид 10 - 30 µg/kg i.v. в комбинация с:
- буторфанол 0,05 mg/kg i.v.

Комбинации с детомидин за преданестетична седация при коне

Следните анестетици могат да се използват след премедикация с детомидин хидрохлорид (10–20 µg/kg), за да заеме животното легнало положение настрани и за постигане на обща анестезия.
- кетамин 2,2 mg/kg i.v. или
- тиопентал 3,0-6,0 mg/kg i.v. или
- гуаифенезин i.v. (до постигане на ефект), последван от кетамин 2,2 mg/kg i.v.

Приложете ветеринарните лекарствени продукти преди кетамин и оставете достатъчно време за постигане на седация (5 минути). Поради това кетаминът и ветеринарният лекарствен продукт никога не трябва да се прилагат едновременно в една и съща спринцовка.

Комбиниране на детомидин с инхалационни анестетици при коне

Детомидин хидрохлоридът може да се използва като седатив при премедикация (10 - 30 µg/kg) преди въвеждане и поддържане на инхалационна анестезия. Инхалационният анестетик се прилага до постигане на ефект. Необходимото количество инхалационни анестетици се намалява значително чрез премедикация с детомидин.

Комбиниране на детомидин за поддържане на инжекционна анестезия (пълна интравенозна анестезия TIVA) при коне

Детомидин хидрохлоридът може да се прилага в комбинация с кетамин и гуаифенезин за поддържане на пълна интравенозна анестезия (TIVA). Най-добре документираният разтвор съдържа гуаифенезин 50-100 mg/ml, детомидин хидрохлорид 20 µg/ml и кетамин 2 mg/ml. 1 g кетамин и 10 mg детомидин хидрохлорид се прибавят към 500 ml 5-10 % гуаифенезин; анестезията се поддържа чрез инфузия на 1 ml/kg/час.

Комбиниране на детомидин с други продукти за постигане и поддържане на обща анестезия при говеда

Детомидин хидрохлорид 20 µg/kg (0,2 ml/100 kg) в комбинация с:
- кетамин 0,5-1,0 mg/kg i.v., i.m. или
- тиопентал 6,0-10,0 mg/kg i.v.

Ефектът от комбинацията детомидин-кетамин трае 20-30 минути, а ефектът от комбинацията детомидин-тиопентал 10-20 минути. Препоръчва се следната процедура: Използвайте две стерилни игли, една за пълнене на спринцовката от флакона и една за инжектиране на пациента. След като необходимото количество бъде изтеглено от флакона, иглата може да бъде извадена от спринцовката. Върху спринцовката може да се постави отделна стерилна игла. Запушалката може безопасно да се пробие до 10 пъти с игла 18-размер и до 30 пъти с игла 21-размер.



RECUDON

Levomethadone 2,5 mg/ml
fenpipramide hydrochloride 0,125 mg/ml
инжекционен разтвор

10 ml

листовка



RECUDON

Levomethadone 5 mg/ml
fenpipramide hydrochloride 0,25 mg/ml
инжекционен разтвор

30 ml

листовка

Аналгезия и премедикация преди процедури.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен за:
- **Коне**: бавно интравенозно приложение
- **Кучета**: бавно интравенозно или интрамускулно приложение

Коне:
Аналгезия
0,1-0,15 mg левометадон-HCL/ 0,005-0,0075 mg фенпипрамид-HCL на kg телесна маса интравенозно.
Съответства на:
100 kg телесна маса: 4,0-6,0 ml (за Recudon 10 ml)
100 kg телесна маса: 2,0-3,0 ml (за Recudon 30 ml)
ветеринарен лекарствен продукт.

Кучета:
Аналгезия
0,2-1,0 mg левометадон-HCL/ 0,01-0,05 mg фенпипрамид-HCL на kg телесна маса интравенозно или интрамускулно. Съответства на: на 10 kg телесна маса: 0,8- 4,0 ml ветеринарен лекарствен продукт. Левометадонът е приблизително два пъти по-мощен от метадоновия рацемат. Дозировката обикновено трябва да бъде половината от дозата метадон. Дози по-високи от 0,5 mg левометадон-HCL на kg трябва да се прилагат само след задълбочена оценка на силата на болката, индивидуалните различия в чувствителността към болка и общото състояние на кучето.

При използване за премедикация в комбинация с ксилазин, медетомидин или дексмедетомидин
Трябва да се използва долната граница на този дозов диапазон, когато ветеринарният лекарствен продукт се използва в комбинация с едно от тези вещества. Оценката на комбинацията, която ще се използва, трябва да се направи от лекуващия ветеринарен лекар въз основа на целта на лечението и физическите характеристики на конкретния пациент. Всички анестетици, използвани за въвеждане или поддържане на анестезия, трябва да се прилагат според ефекта.



PREVOMAX

Maropitant 10 mg/ml
инжекционен разтвор

20 ml

листовка

Кучета
- За лечение и предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия.
- За предотвратяване на повръщане, с изключение на повръщане, предизвикано от пътуване.
- За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.
- За предотвратяване на периоперативно гадене и повръщане и подобряване на възстановяването от обща анестезия след употребата на μ-опиатния рецепторен агонист морфин.

Котки
-За предотвратяване на повръщане и намаляване на гадене, с изключение на тези, предизвикани от пътуване.
-За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За подкожно или интравенозно приложение при кучета и котки. Инжекционният разтвор Prevomax трябва да се прилага подкожно или интравенозно, веднъж дневно в доза 1 mg маропитант/kg телесна маса (1 ml/10 kg телесна маса). Лечението може да се повтори до пет последователни дни. При интравенозно приложение, Prevomax трябва да се приложи като еднократна болус инжекция, без да се смесва продуктът с други разтвори.



URIPHEX

Phenylpropanolamine 50 mg/ml
перорален разтвор

100 ml

листовка

Лечение на уринарна инконтиненция, свързана с некомпетентност на уретралния сфинктер при женски кучета. Ефикасността е доказана само при кучки с овариохистеректомия.

Дозировка, начини и метод на приложение

Перорално приложение на 3 mg фенилпропаноламин хидрохлорид на kg телесна маса на ден, разделено на 2 или 3 приема за 3 до 4 седмици. Когато симптомите се върнат, лечението може да се поднови.

Таблица за дозиране с примери:

kg телесна маса	индивидуална доза (ml)		kg телесна маса	индивидуална доза (ml)	
	два пъти дневно	три пъти дневно		два пъти дневно	три пъти дневно
2	0,06		32	0,96	0,64
4	0,12	0,08	34	1,02	0,68
6	0,18	0,12	36	1,08	0,72
8	0,24	0,16	38	1,14	0,76
10	0,3	0,2	40	1,2	0,8
12	0,36	0,24	42	1,26	0,84
14	0,42	0,28	44	1,32	0,88
16	0,48	0,32	46	1,38	0,92
18	0,54	0,36	48	1,44	0,96
20	0,6	0,4	50	1,5	1
22	0,66	0,44	52	1,56	1,04
24	0,72	0,48	54	1,62	1,08
26	0,78	0,52	56	1,68	1,12
28	0,84	0,56	58	1,74	1,16
30	0,9	0,6	60	1,8	1,2

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.
В случай на двукратен прием на ден, кучето трябва да тежи най-малко 1,6 kg. В случай на три приема на ден, кучето трябва да тежи най-малко 2,5 kg.



BODYGLOB

Canine parvovirus
Canine distemper virus
Adenovirus
Parainfluenza virus
инжекционен разтвор
(хиперимунен хомоложен серум)

5 ml

листовка

За терапия и профилактика на инфекциозни заболявания при кучета: парвовироза, гана, параинфлуенца, инфекциозен хепатит и ларинготрахеит.

Дозировка, начини и метод на приложение
За интрамускулно или интравенозно приложение.

Кученца на възраст под 7 седмици:	1 ml
Кучета с тегло по-малко от 5 kg:	2,5 ml
Кучета с тегло под 10 kg:	5 ml
Кучета с тегло над 10 kg:	10 ml

За интрамускулно приложение, дозата над 5 ml трябва да се раздели в две места на приложение.

Съвети за правилното прилагане на продукта
При остро протичане на заболяването се препоръчва няколкократно приложение на същата доза в рамките на 24 или 48 часа. В случаи на остро протичане на заболяването може да се прилага интравенозно.
Оставете серума да достигне стайна температура преди употреба.



ROTAGAL

Bovine rotavirus
Bovine coronavirus
Escherichia coli
инжекционна емулсия
(ваксина за бременни крави и юници)

5 дози

листовка

За активна имунизация на бременни крави и юници, с цел предаване на пасивен имунитет на потомството, насочен към намаляване на смъртността, тежестта и продължителността на диария, причинена от говежди ротавирус, коронавирус и ентеропатогенни E. coli F5 (K99) и намаляване на вероятността от контаминиране с ротавирус и коронавирус от заразени телета. Начало на имунитета: пасивен имунитет започва с подаване на колостра. Продължителност на имунитета: при изкуствено хранени телета от обща “колострална банка”, защитата продължава до момента на спиране на храненето с колостра. При телета, които се хранят естествено (бозаят), защитата срещу ротавирус продължава най-малко 7 дни и срещу коронавирус най-малко 14 дни.

Дозировка, начини и метод на приложение
Интрамускулно приложение.
Една доза: 3 ml
Една ваксинация по време на всяка бременност между 12-3 седмица, преди очакваното отелване.



COLUMBA

Pigeon paramyxovirus
инжекционна емулсия
(ваксина за гълъби)

50 дози

листовка

За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици, за да се намали тежестта на клиничните признаци, смъртността и отделянето на вируса след инфекция, причинена от парамиксовирус тип 1.

Изграждане на имунитет:
14 дни след инжекцията.

Продължителност на имунитета:
1 година

Дозировка, начини и метод на приложение
Подкожно в областта на гръбната част на врата към опашката, не на главата или интрамускулно в гръдния мускул. Доза ваксина за всяка възрастова категория на ваксинираните животни е 0,3 ml. Първична ваксинация: (млади гълъби) първата инжекция от 4-седмична възраст нататък. Препоръчително е да се направи втора инжекция 21-28 дни по-късно, в зависимост от епизоотологичната обстановка. Реваксинация: (възрастни гълъби) 1 инжекция на всеки 12 месеца, най-малко 21 дни преди началото на летателния и изложбения сезон. Продължителност на имунитета 1 година. Преди приложение се оставя да се затопли до стайна температура. Разклатете добре преди и от време на време по време на приложението. Приложете при асептични условия. Трябва да се използват само стерилни спринцовки и игли.



PHARMAVAC COLUMBI 2

Pigeon paramyxovirus
Pigeon herpes virus
(ваксина за гълъби)

50 дози

листовка

За активна имунизация на гълъби срещу парамиксовирус тип 1 и херпесвирусна инфекция при гълъби.

Изграждане на имунитета:
14 дни след последната инжекция

Продължителност на имунитета:
1 година

Дозировка, начини и метод на приложение
Ваксината се прилага подкожно в областта на шията или интрамускулно в гърдата или бедрената мускулатура. Дозата ваксина за всички възрастови категории животни е 0,3 ml. Ваксинирането на млади животни стимулира създаването на антитела срещу вирусни антигени във ваксината в рамките на 10-14 дни след първото им приложение. Реваксинация след 3 до 5 седмици осигурява надеждна защита на ваксинираните животни за инфекции, причинени от парамиксовирус тип 1 и херпес вирус. Реваксинации: веднъж годишно. Необходимо е да се ваксинират възрастни гълъби в застрашена среда при разплод два пъти годишно за период от максимум 6 месеца.



PHARMAVAC PHA

Pigeon Paramyxovirus
Pigeon Herpesvirus
Pigeon Adenovirus
(ваксина за гълъби)

50 дози

листовка

За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици:
- за намаляване на смъртността, честотата и тежестта на клиничните признаци, причинени от парамиксовирус тип 1 (PMV1);
- за намаляване на тежестта на клиничните признаци, груби лезии и отделяне на вируси, причинени от херпесвирус на гълъби (PHV1);
- за намаляване тежестта на клиничните признаци и груби лезии, причинени от аденовирус, а именно тип 7 / E, 2 / D, 3 / D и 4 / C, принадлежащи към подгрупа I.

Изграждане на имунитета:
3 седмици след ваксинацията

Продължителност на имунитета:
- 12 месеца след ваксинация за компонент PMV1
- 5 месеца след ваксинацията за PHV1 и AdV компонент

Продължителността на имунитета срещу PHV1 и AdV е демонстрирана чрез клетъчно медииран имунитет и серологични данни.

Дозировка, начини и метод на приложение
Една доза: 0,3 ml
Прилагайте една доза подкожно в гръбната област на шията към опашката (не към главата) от 4-седмична възраст.



RP VACC

Pigeon rotavirus
Pigeon paramyxovirus
(ваксина за гълъби)

50 дози

листовка

За активна имунизация на гълъби от 4-седмична възраст:
- за намаляване на честотата и тежестта на клиничните признаци, макроскопските лезии и отделянето на вируса, причинени от ротавирус на гълъбите група А, генотип G18P[17] (PiRV),
- за намаляване на смъртността, честотата и тежестта на клиничните признаци, причинени от парамиксовирус тип 1 (PMV1).

Изграждане на имунитета:
2 седмици след схемата на първична ваксинация
Продължителност на имунитета:
8 месеца (PiRV) / 9 месеца (PMV1) след първичната ваксинационна схема (доказано чрез провокационен тест), чрез интрамускулна инжекция.

При интрамускулно приложение, в полеви проучвания са установени нива на антитела, сравними с тези, получени при провокационен тест, дори една година след последната инжекция. Продължителността на имунитета не е установена при подкожно приложение.

Дозировка, начини и метод на приложение
Подкожно или интрамускулно приложение.
Една доза: 0,3 ml
Прилага се интрамускулно в бедрения мускул или подкожно в гръбната част на шията, в посока към опашката (не към главата).
Първична ваксинационна схема:
Първа доза: от 4-седмична възраст нататък
Втора доза: 3 седмици по-късно
Реваксинация:
Прилага се една доза не по-късно от една година след последната ваксинация. При стада с високо ниво на инфекциозен натиск от PiRV и/или PMV1 се препоръчва реваксинация на гълъбите на всеки 8–9 месеца след последната ваксинация.



DIFTOVAC

Live pigeon pox virus
(ваксина за гълъби)

50 дози

листовка

За активна имунизация на гълъби срещу вируса на шарка по гълъбите и за намаляване на клиничните признаци и лезии, свързани с инфекция от вируса.

Изграждане на имунитета:
най-късно 21 дни след ваксинацията.
Продължителност на имунитета:
най-малко 9 месеца.

Дозировка, начини и метод на приложение
Разреждане за прилагане чрез перо-фоликулен метод: Ваксина със съдържание от 50 дози се разрежда в 5 ml с Разредител D. Начин на прилагане чрез перо-фоликулен метод: Отстранете 10-15 пера от средната страна на крака и намажете ваксината в откритите фоликули.
Опитайте се да избегнете кървене от фоликулите, защото това може да доведе до силна локална реакция. Не дезинфекцирайте мястото на приложение. Не дезинфекцирайте оборудването по време на употреба. Дозата ваксина за всяко животно е 0,1 ml. Разреждане за подкожно приложение: Ваксина със съдържание на 50 дози се разрежда в 10 ml Разредител D. Метод чрез подкожно приложение: Една доза за подкожна ваксинация е 0,2 ml. Препоръчва се мястото на приложение да е в областта на врата.
Схема за ваксиниране:
Първична ваксинация: на 4-седмична възраст
Реваксинация: при размножаване, застрашено от инфекция с вируса на шарка: на всеки 9 месеца. При размножаване, докато рискът от инфекция е малко вероятен, е достатъчна годишната реваксинация.



CASTOREX RHDV 2

Rabbit haemorrhagic disease virus, тип 2
(ваксина за зайци)

10 и 20 дози

листовка

За активна имунизация на зайци за предотвратяване на смъртност, причинена от вируса на RHD тип 2.

Изграждане на имунитета: 7 дни.
Продължителност на имунитета: 1 година.

Дозировка, начини и метод на приложение
Подкожно приложение.
Една доза: 0,5 ml
Първична ваксинация:
Една инжекция при зайци на възраст от 6 седмици.
В зависимост от епизоотологичната обстановка е възможно ваксиниране на зайци от 4-седмична възраст, последвано от бустерна ваксинация 4 седмици след първата инжекция.
Реваксинация:
Една инжекция на всеки 12 месеца.






EUTHANIMAL 40%

Pentobarbital 400 mg/ml
Инжекционен разтвор

100 ml



листовка

За евтаназия.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Интравенозно приложение.
Интраперитонеално приложение.
Интракардиално приложение.
За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.
За предпочитане е този ветеринарен лекарствен продукт да се прилага чрез еднократна интравенозна инжекция. При по-големи животни, се препоръчва употребата на предварително поставен интравенозен катетър. При прилагане на ветеринарния лекарствен продукт по начин, различен от интравенозния, животните трябва да бъдат силно седатирани или в безсъзнание и да не показват никаква реакция на болкови стимули, с изключение на интраперитонеалното прилагане при плъхове и мишки. Интракардиалната инжекция е допустима само след предварителна дълбока седация или анестезия. Използването на пентобарбитал интраперитонеално при неседирани плъхове и мишки е приемливо само когато са взети мерки за избягване на неправилно инжектиране, включително използването на подходящи размери на иглите (например 26G за мишки). За интраперитонеалните или интрацеломните пътища на приложение, се препоръчват по-високи дози, когато е възможно. Ако до 2 минути не се стигне до сърдечен арест, трябва да се приложи втора доза, за предпочитане чрез бърза интравенозна инжекция или ако това не е възможно, чрез интракардиална инжекция. Флаконът не може да бъде пробождан повече от 20 пъти.

Таблица, съдържаща информация за дозировката при всеки вид животни.

Видове животни	Начин на приложение	Дозировка
Говеда, коне, свине, кози, овце, кучета, котки	Интравенозно	Препоръчителната доза е 100 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.25 ml/kg)
Мишки	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 250 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.625 ml/kg), може да се използва до 1600 mg/kg т.м
Плъхове	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), може да се използва до 800 mg/kg т.м
Зайци, хамстери, морски свинчета	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиалн	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg)
Кокошки, гълъби, патици	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg)
Малки декоративни птици	Интрацеломно	Препоръчителната доза е 1300 mg/kg (съответстваща на 3.25 ml/kg)
Змии	(Интравенозно) Интраперитонеално Интракардиално	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg). Интрацеломното или интракардиалното приложение трябва да бъдат първи избор
Костенурки	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), за интрацеломното приложение може да се използва до 1100 mg/kg т.м.
Гущери	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 400 mg/kg т.м. (съответстваща на 1 ml/kg), може да се използва до 800 mg/kg т.м.
Жаби	(Интравенозно) Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), може да се използва до 1100 mg/kg т.м. Интрацеломното или интракардиалното приложение трябва да бъдат първи избор



CPV Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на кучешки парвовирус (Canine Parvovirus)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност:
95.74% срещу PCR
Специфичност:
100% срещу PCR

Тестът Bioguard Canine Parvovirus (CPV) Ag е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на кучешки парвовирус (*Canine Parvovirus*) във фекални проби от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антиген на CPV, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличието на антиген на кучешкия парвовирус (CPV Ag) в изследваната проба.



CDV Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на вируса на кучешка чума (Гана)/(Canine Distemper Virus)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Очен и назален секрет на куче
Спецификации
Чувствителност:
100% спрямо RT-PCR
Специфичност:
98,08% спрямо RT-PCR

Тестът Bioguard Canine Distemper Virus (CDV) Ag е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на вируса на кучешка чума (*Canine Distemper Virus*) в очен и назален секрет на кучета. Устройството има прозорец с невидими зони Т (тестова) и С (контролна). Когато пробата се нанесе в гнездото, реагентът се движи латерално по тест лентата. Ако в пробата има достатъчно CDV Ag, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) трябва винаги да се появи след нанасяне на пробата, което гарантира валидността на теста. Така устройството може точно да покаже наличието на антиген на вируса на кучешка чума (CDV Ag) в изследваната проба.



Giardia Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигена на Giadia

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност:
100% срещу микр. изследване
Специфичност:
95.24% срещу микр. изследване

Тестът Bioguard Giardia (GIA) Ag е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на антигена на Гиардия в изпражнения на куче или котка. Устройството за тестиране има прозорец с невидими зони Т (тестова) и С (контролна). Когато пробата се приложи в гнездото на теста, реагентът се движи латерално по повърхността на лентата. Ако в пробата има достатъчно GIA Ag, ще се появи видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) трябва винаги да се появи след прилагане на пробата, което показва, че тестът е валиден. По този начин устройството може точно да покаже наличието на антигена на Giardia (GIA Ag) в изследваната проба.



CPV Ag/CDV Ag Combo Test

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антигени на вируса на кучешката чума (Гана)/(Canine Distemper Virus) и кучешкия парвовирус (Canine Parvovirus)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
CDV: Очен и назален секрет на куче
CPV: Кучешки фекалии
Спецификации
CDV:
Чувствителност:
100% срещу RT-PCR
Специфичност:
98.08% срещу RT-PCR
CPV:
Чувствителност:
95.74% срещу PCR
Специфичност:
100% срещу PCR

Тестът Bioguard Canine Distemper Virus (CDV) Ag / Canine Parvovirus (CPV) Ag е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антигени на вируса на кучешката чума (Canine Distemper Virus) и кучешкия парвовирус (Canine Parvovirus) при кучета. Тестът се използва за изследване на очен и назален секрет, както и на фекални проби. Тестовото устройство разполага с прозорец за отчитане, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След нанасяне на пробата в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. При наличие на достатъчно количество антиген на CDV или CPV се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което гарантира валидността на теста. По този начин тестът позволява точно и надеждно установяване на наличието на антигени на вируса на кучешката чума и кучешкия парвовирус в изследваната проба.



VLabs 3DX Combo Test

(CPV Ag/CCV Ag/Giardia Ag)

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антигени на кучешки парвовирус (CPV), кучешки коронавирус (CCV) и Гиардия

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
CPV:
Чувствителност:
95.74% спрямо PCR
Специфичност:
100% спрямо PCR
CCV:
Чувствителност:
93.10% спрямо гнездова PCR
Специфичност:
97.52% спрямо гнездова PCR
Giardia:
Чувствителност:
100% спрямо микроскопски резултат
Специфичност:
95.24% спрямо микроскопски резултат

Тестът Bioguard VLabs 3DX е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на антигени на канинен парвовирус (CPV), канинен коронавирус (CCV) и Гиардия в изпражнения на кучета. Тестовото устройство има прозорец за четене, с невидими зони Т (тестова) и С (контролна). При добавяне на пробата в гнездото реагентът се движи латерално по тест линията. Ако в пробата има достатъчно количество CPV Ag / CCV Ag / GIA Ag, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появи след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин устройството точно показва наличието на антигените CPV, CCV и Гиардия в изследваната проба.



CHW Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на Dirofilaria immitis (на зрели женски дирофиларии)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма
Спецификации
Чувствителност:
99.03% спрямо Аутопсия
Специфичност:
100% спрямо Аутопсия

Тестът Bioguard Canine Heartworm (CHW) Ag е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на Dirofilaria immitis в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество CHW антиген, в зоната Т се появява видима тестова линия. Контролната линия С трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на CHW антиген в изследваната проба.



Leishmania Ab Test

Тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу Leishmania (LSH Ab)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма
Спецификации
Чувствителност:
95.83 % спрямо ELISA
Специфичност:
93.07 % спрямо ELISA

Тестът Bioguard Canine Leishmania (LSH) Ab е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу Leishmania (LSH Ab) в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество LSH антитела, в зоната Т се появява видима тестова линия. Контролната линия С трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на LSH антитела в изследваната проба.



Lyme Ab Test

Тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу B. burgdorferi

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма
Спецификации
Чувствителност:
95.00% спрямо PCR
Специфичност:
96.67% спрямо PCR

Тестът Bioguard Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) (Lyme) Ab е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу B. burgdorferi в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антитела срещу B. burgdorferi, в зоната Т се появява видима тестова линия. Контролната линия С трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на антитела срещу B. burgdorferi в изследваната проба.



VLabs 4BX Plus Combo Test

CHW Ag | Babesia spp. (Gibsoni & Canis) Ab | E.canis Ab | Anaplasma Ab

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу Babesia spp. (Gibsoni & Canis), антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма

Спецификации

Anaplasma:	E. canis:	CHW:	Babesia spp.(Gibsoni & Canis):
Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:
94.59% срещу PCR	93.55% срещу PCR	99.03% срещу PCR	95.05% срещу PCR
Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:
98.98% срещу PCR	96.86% срещу PCR	100% срещу PCR	92.24% срещу PCR

Тестът Bioguard VLabs 4BX Plus е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу Babesia spp., антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis) в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество Babesia spp. (Gibsoni & Canis) Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag, в зоната T се появява видима тестова линия. Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на Babesia spp.(Gibsoni & Canis) Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag в изследваната проба.



VLabs 4X Combo Test

CHW Ag | Lyme Ab | E. canis Ab | Anaplasma Ab

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу Borrelia burgdorferi (Lyme Ab), антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма

Спецификации

Borrelia burgdorferi:	Anaplasma:	E. canis:	CHW:
Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:
94.59% спрямо PCR	93.55% спрямо PCR	99.03% спрямо PCR	95.05% спрямо PCR
Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:
98.98% спрямо PCR	96.86% спрямо PCR	100% спрямо PCR	92.24% спрямо PCR

Тестът Bioguard VLabs 4X е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу Borrelia burgdorferi (Lyme Ab), антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis) в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество Lyme Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag, в зоната T се появява видима тестова линия. Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на Lyme Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag в изследваната проба.



VLabs 4LX Combo Test

CHW Ag | LSH Ab | E. Canis Ab | Anaplasma Ab

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу Leishmania (LSH Ab), антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма

Спецификации

Anaplasma:	E. canis:	CHW (Dirofilaria immitis):	Leishmania:
Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:	Чувствителност:
94.59% спрямо PCR	93.55% спрямо PCR	99.03% спрямо аутопсия	95.83% спрямо ELISA
Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:	Специфичност:
98.98% спрямо PCR	96.86% спрямо PCR	100% спрямо аутопсия	93.07% спрямо ELISA

Тестът Bioguard VLabs 4LX е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу Leishmania (LSH Ab), антитела срещу Ehrlichia canis (E. canis Ab), антитела срещу Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys (ANA Ab), антиген на кучешки сърдечен червей (Canine heartworm, CHW Ag, Dirofilaria immitis) в кръв от кучета. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество LSH Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag, в зоната T се появява видима тестова линия. Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на LSH Ab, E. canis Ab, ANA Ab, CHW Ag в изследваната проба.



FPV Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на вируса на котешката панлевкопения
(Feline Panleukopenia Virus)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност:
92,54 % спрямо PCR
Специфичност:
97,09 % спрямо PCR

Тестът Bioguard Feline Panleukopenia Virus (FPV) Ag е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на вируса на котешката панлевкопения (Feline Panleukopenia Virus) в изпражнения на котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антиген на FPV, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличие на антиген на вируса на котешката панлевкопения (FPV Ag) в изследваната проба.



FCoV Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на котешки коронавирус (Feline Coronavirus)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност:
96,67 % спрямо RT-PCR
Специфичност:
100 % спрямо RT-PCR

Тестът Bioguard Feline Coronavirus (FCoV) Ag е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на котешки коронавирус (Feline Coronavirus) в изпражнения на котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антиген на FCoV, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличие на антиген на котешкия коронавирус (FCoV Ag) в изследваната проба.



FCoV Ab Test

Тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу котешки коронавирус (FCoV Ab)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Серум | Плазма | Плеврален излив или Асцитна течност на котка
Спецификации
Чувствителност:
88.57% спрямо ELISA
Специфичност:
94.23% спрямо ELISA.

Тестът Bioguard Feline Coronavirus (FCoV) Ab е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на антитела срещу котешки коронавирус (FCoV Ab) в серум, плазма, плеврален излив или асцитна течност на котки. Тестовият уред има прозорец за четене с невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След нанасяне на пробата в гнездото, реагентът се движи латерално по лентата. Ако в пробата има достатъчно FCoV Ab, се появява видима тестова линия (Т). Контролната линия (С) винаги трябва да се появява след нанасянето, което удостоверява валидността на резултата. Така устройството точно показва наличието на антитела срещу котешки коронавирус (FCoV Ab) в изследваната проба.



FIV Ab Test

Тест за бързо и качествено откриване на антитела срещу вируса на котешкия имунодефицит (FIV Ab) в кръв от котки.

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Кръв | Серум | Плазма
Спецификации
FIV:
Чувствителност: 97.50% спрямо Western blot
Специфичност: 96.67% спрямо Western blot

Тестът Bioguard Feline Immunodeficiency Virus (FIV) Ab е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антитела срещу вируса на котешкия имунодефицит (FIV Ab) в кръв от котки. Тестовото устройство разполага с прозорец за отчитане, съдържащ невидими зони Т (тестова) и С (контролна). След нанасяне на пробата в съответното гнездо реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FIV антитела, в тестовата зона (Т) се появява видима линия. Контролната линия (С) трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което удостоверява валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на FIV антитела в изследваната проба.



Feline 3DX Combo Test

(FPV Ag / FCoV Ag / Giardia Ag)

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на антигени на котешки парвовирус (FPV), котешки коронавирус (FCoV) и Giardia (GIA)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
FPV:
Чувствителност: 92.54% срещу PCR
Специфичност: 97.09% срещу PCR

FCoV:
Чувствителност: 96.67% срещу RT-CR
Специфичност: 100% срещу PCR

Giardia:
Чувствителност: 100% срещу микр. изследване
Специфичност: 95.24% срещу микр. изследване

Тестът Bioguard Feline 3DX е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на котешки парвовирус (FPV), котешки коронавирус (FCoV) и Giardia (GIA) във фекални проби от котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FPV Ag, FCoV Ag или GIA Ag, се появява видима тестова линия (T). Контролната линия (C) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличието на антигени на FPV, FCoV или Gia в изследваната проба.



Feline 3X Combo Test

(FeLV Ag / FIV Ab / FCoV Ab)

Комбиниран тест за бързо и качествено откриване на FeLV антиген (FeLV Ag), FIV антитела (FIV Ab), FCoV антитела (FCoV Ab)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
FeLV/FIV: Серум | Плазма
FCoV: Серум | Плазма | Плеврален излив | Абдоминален излив
Спецификации
FIV:
Чувствителност: 97,50% спрямо Western blot
Специфичност: 96,67% спрямо Western blot

FeLV:
Чувствителност: 98,04% спрямо RT-PCR
Специфичност: 98,70% спрямо RT-PCR

FCoV:
Чувствителност: 88,57% спрямо Western blot
Специфичност: 94,23% спрямо Western blot

Тестът Bioguard Feline 3X е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на FeLV антиген (FeLV Ag), FIV антитела (FIV Ab), FCoV антитела (FCoV Ab) в серум, плазма, плеврален излив и асцит от котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FeLV Ag, FIV Ab, FCoV Ab, в зоната T се появява видима тестова линия. Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на FeLV Ag, FIV Ab, FCoV Ab в изследваната проба.



FeLV Ag/FIV Ab Combo Test

Тест за бързо и качествено откриване на FeLV антиген (FeLV Ag) и FIV антитела (FIV Ab)

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма
Спецификации
FIV:
Чувствителност:
97,50% спрямо Western blot
Специфичност:
96,67% спрямо Western blot

FeLV:
Чувствителност:
98,04% спрямо RT-PCR
Специфичност:
98,70% спрямо RT-PCR

Тестът Bioguard Feline Leukemia Virus (FeLV) Ag / Feline Immunodeficiency Virus (FIV) Ab Combo е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на FeLV антиген (FeLV Ag) и FIV антитела (FIV Ab) в кръв от котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FeLV Ag и/или FIV Ab, в зоната T се появява видима тестова линия. Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството надеждно и точно показва наличието на FeLV Ag и/или FIV Ab в изследваната проба.



FCV Ag/FHV Ag Combo Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на котешки калицивирус (FCV Ag) и котешки херпесвирус (FHV Ag)


1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Очен и назален секрет
Спецификации
FCV:
Чувствителност:
98.51 % спрямо RT-PCR
Специфичност:
100 % спрямо RT-PCR

FHV:
Чувствителност:
98.61 % спрямо гнездова PCR
Специфичност:
100 % спрямо гнездова PCR

Комбинираният тест Bioguard Feline Calicivirus (FCV) antigen / Feline Herpesvirus (FHV) antigen е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, предназначен за бързо и качествено откриване на антигени на котешки калицивирус (FCV Ag) и котешки херпесвирус (FHV Ag) в очен и назален секрет на котки. Тестовото устройство има прозорец за тестване, съдържащ невидими зони T (тестова) и C (контролна). След като пробата се нанесе в съответното гнездо, реагентът се разпространява латерално по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество FCV Ag или FHV Ag, се появява видима тестова линия (T). Контролната линия (C) винаги трябва да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава, че тестът е валиден. По този начин касетата точно показва наличие на антигени на FCV и/или FHV в изследваната проба.



Toxoplasma IgM/IgG Ab

Тест за бързо и качествено откриване на Toxoplasma IgM/IgG

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Цяла кръв | Серум | Плазма
Спецификации
Чувствителност:
92.59% спрямо ELISA
Специфичност:
94.37% спрямо ELISA

Тестът Bioguard Toxoplasma IgM/IgG Ab е имунохроматографски анализ тип „сандвич“ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на Toxoplasma IgM/IgG в котешка кръв. Тестовото устройство има прозорец за тестване, покрит с невидима IgM(1)/IgG(2) (тестова) зона и C (контролна) зона. След нанасяне на пробата в съответното гнездо, реагентът ще се разтече странично по повърхността на тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антитела Toxoplasma IgM/IgG, се появява видима линия IgM(1)/IgG(2). Контролната линия C трябва винаги да се появява след нанасяне на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството точно показва наличието на антитела Toxoplasma IgM/IgG в изследваната проба.



Giardia Ag

Тест за бързо и качествено откриване на антигена на Гиардия

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тестт
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност:
100% срещу микр. изследване
Специфичност:
95.24% срещу микр. изследване

Тестът Bioguard Giardia (GIA) Ag е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на антигена на Гиардия в изпражнения на куче или котка. Устройството за тестиране има прозорец с невидими зони T (тестова) и C (контролна). Когато пробата се приложи в гнездото на теста, реагентът се движи латерално по повърхността на лентата. Ако в пробата има достатъчно GIA Ag, ще се появи видима тестова линия (T). Контролната линия (C) трябва винаги да се появи след прилагане на пробата, което показва, че тестът е валиден. По този начин устройството може точно да покаже наличието на антигена на Giardia (GIA Ag) в изследваната проба.



FELINE BLOOD TYPING

Test

Тест комплект, импрегниран със сухи антитела Анти-А или лектин за определяне на кръвна група А, В или АВ

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Аглутинация
Проба
Кръв

Не използвайте кръв, събрана преди повече от 5 дни. Да се използва от ветеринарен лекар. Съхранявайте продукта при стайна температура. При пациенти с автоимунни заболявания съществува риск от получаване на фалшиво положителни или фалшиво отрицателни резултати. Хематокритът на пробата трябва да бъде 20–35% за аглутинация при определяне на кръвната група на котки. Продуктът не трябва да се използва след изтичане на срока на годност. С цел предотвратяване на неправилна употреба и запазване на качеството, използвайте само буфера, включен в комплекта.



PERITONITIS DETECTION

Test

Бърз тест за качествено откриване или изключване на перитонит чрез анализ на изливи за наличие на протеини, фибриноген и възпалителни медиатори

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Rivalta тест
Проба
Плеврален излив

Комплектът Bioguard Peritonitis Detection Kit, разработен и произведен от Bioguard Corporation, може да различава трансудат от ексудат. Когато ексудатът съдържа реактивни протеини, той образува капка на излив, която се утаява в реакционния разтвор. По време на теста могат да се наблюдават утаечни продукти с форма на сълза, мъгла или размазани образувания. За разлика от това, трансудатът се разтваря напълно в реакционния разтвор по време на утаяването. Комплектът Bioguard Peritonitis Detection Kit е бърз, прост и надежден метод за откриване или изключване на перитонит при котки.



Salmonella Ag Test

Тест за бързо и качествено откриване на антигени на Salmonella

1 тест в опаковка

листовка

Методология
Имунохроматографски тест
Проба
Фекалии
Спецификации
Чувствителност: 95.05 % спрямо PCR
Специфичност: 99.00 % спрямо PCR
Размер на опаковката:
1 тест в опаковка

Тестът Bioguard Salmonella Ag е имунохроматографски „сандвич“ анализ с латерален поток, разработен и произведен от Bioguard Corporation, за бързо и качествено откриване на антигени на Salmonella в изпражнения на птици и влечуги. Тестовото устройство има прозорец за четене, в който са невидими зоните T (тестова) и C (контролна). При нанасяне на пробата в гнездото реагентът се движи латерално по тест лентата. Ако в пробата има достатъчно количество антиген Salmonella, се появява видима T линия. Контролната линия (C) винаги трябва да се появи след приложение на пробата, което потвърждава валидността на теста. По този начин устройството точно показва наличието на антиген Salmonella в изследваната проба.





Dermatophyte Test

Хранителна среда за култивиране и идентифициране на дерматофити

4 теста + контрастна течност

листовка

Методология
Култивиране в среда
Проба
Люспи и/или косми

Дерматофитозата представлява инфекция на кератинизираните тъкани – кожа, косми, нокти и рогов слой (stratum corneum). Причинява се от видовете Microsporum canis, Microsporum gypseum или Trichophyton mentagrophytes. Над 90% от случаите на дерматофитоза при кучета и котки се причиняват от Microsporum canis. Инфекциите, причинени от Microsporum gypseum и Trichophyton mentagrophytes, са редки. Дерматофитозата при коне, говеда и домашни птици най-често се причинява от различни видове Trichophyton. Растежът на Microsporum или Trichophyton върху хранителната среда Diafarm DT предизвиква алкална реакция, която води до промяна в цвета на средата към червено. Обикновено това настъпва в рамките на първите два дни. След 12 дни може да се наблюдава допълнителна промяна на цвета, както и растеж на сапрофитни гъби. Затова за потвърждаване на резултата трябва да се използват морфологията на колониите и микроскопското изследване. Средата Diafarm DT се използва като помощно средство при диагностиката и не осигурява окончателен резултат. Положителният резултат е с висока диагностична стойност само ако е свързан със симптоматично животно. Средата Diafarm DT трябва да се съхранява при стайна температура и да бъде защитена от пряка слънчева светлина.



PROFICARB GEL

Съдържание: Активен въглен (30%), пропилен гликол, декстроза, натриев хлорид, калиев хлорид, Бентонит 100 000 mg; Натриев пропионат 25 000 mg, Екстракт от кестен 5 000 mg

100 ml

Допълващ фураж за лошо храносмилане (диария), предотвратяване на токсемия.

Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

При първите симптоми на лошо храносмилане или диария, нанесете посоченото количество гел, върху основата на езика. Използвайте 1 – 3 последователни дни, 2 пъти на ден, препоръчителна доза:

- куче – 0,5 ml (1 kg телесно тегло)
- теле, жребче – 20 ml
- агне, прасенце – 2-5 ml
- крава, кон – 20 ml (100 kg телесно тегло)



ENTEROLYT COMPLETE

Съдържание в саше: Сурова пепел: 17,6%; Сурови фибри: <1%; Суров протеин: <1%; Сурови мазнини: <1%; Хлориди: 5,5%; Натрий: 5,5%; Калий: 1,3%; SID (силна йонна разлика): 60 mmol; Осмоларност: 375 mOsm/L

90 g

Диетичен допълващ фураж за млади телета.
Enterolyt Complete трябва да се използва, при съществуващ риск от храносмилателни смущения и периоди на подобна диария. Препоръчително е да се потърси мнение от ветеринарен лекар преди употреба. Специфична хранителна цел: Стабилизиране на баланса на течности и електролити. Съхранявайте на сухо и при стайна температура.

Дозировка, метод и начини на приложение

Препоръчителен период на употреба: 1 до 7 дни (1 до 3 дни, ако се хранят единствено и само с Enterolyt Complete). Добавете едно пакетче Enterolyt Complete (90 грама) към 2 литра вода, затоплена (до 38 ° C). Разбъркайте старателно и приложете веднага. Съхранявайте на сухо и при стайна температура.

Дозировка на теле

от 35-40 kg: 1-ви и 2-ри ден: 2 литра разтвор на Enterolyt Complete 2-3 пъти дневно. 3-ти и 4-ти ден: 2 литра разтвор на Enterolyt Complete 1-2 пъти дневно. От третия ден телето трябва постепенно да се върне към нормалното си хранене. Млякото трябва да се прилага отделно, а между тях да се прилага Enterolyt Complete разтвор. 5-ти до 7-ми ден: 2 литра разтвор на Enterolyt Complete веднъж дневно или при необходимост.




DIALACTU

Състав в kg: Лактулоза: 99.3%; Декстроза

100 ml

За компенсиране на лошо храносмилане, екзокринна недостатъчност на панкреаса. Използвайте при запек. Dialactu спомага за свързването на течността в червата и по този начин увеличава количеството на чревното съдържимо, спомагайки за стимулиране на чревната перисталтика.

Дозировка, метод и начини на приложение
Кучета и котки: 3 ml на 5 kg телесно тегло на ден. Прилагайте веднъж на ден и за предпочитане сутрин. Прилага се 3-12 седмици, но при хронична панкреатична недостатъчност и констипация през целия живот. Поставете канюлата за еднократна употреба върху спринцовката и измерете необходимата доза Dialactu. Прилага се през устата или се смесва с храна. Препоръчва се консултация с ветеринарен лекар преди употреба.



DIACUREX

Съдържание в kg: Продукти от преработка на растения (Plantago ovata); Декстроза; Натриев хлорид; Калиев хлорид; Магнезиев оксид; Натриева сол на органични киселини

175 g

За нормализиране на остри нарушения на храносмилането/абсорбция в стомашно-чревния тракт и дебелото черво (фибри и електролити). Също така да се използва по време на необходимата реконвалесценция. Полезен и при забавено храносмилане. Животното трябва да има достъп до достатъчно чиста вода за времето на употреба.

Дозировка, метод и начини на приложение
Кучета:
5 грама DIACUREX прах за 10 kg телесно тегло 1-3 пъти дневно колкото е необходимо, до 1 седмица.
Котки:
2,5 грама DIACUREX 1-3 пъти дневно, колкото е необходимо, до 1 седмица.

Една равна мерителна лъжичка = прибл. 0,8 грама. Смесете в храната или разредете в 150 ml вода. Смесеното количество с храната или приготвения разтвор трябва да се използва веднага. Изхвърлете излишната фуражна смес/разтвор.







PROBIOTIC PASTE

Съдържание в kg: Растително масло (Brassica napus); Пшенично нишесте; Продукт от преработка на билки (Gentiana lutea L). Стабилизатор на чревната флора: Enterococcus faecium $10^{1°}$cfu/kg

50 g

Съдържа млечно-кисели бактерии, които поддържат и възстановяват нормалното храносмилане. Diafarm Probiotic паста може да се използва при стомашен дискомфорт и по време на храносмилателни разстройства като диария, както и в периоди с повишен риск от храносмилателни смущения.

Дозировка, метод и начини на приложение

Кучета:

Една доза = приблизително 1 см. паста на 10 kg телесно тегло, 2 пъти дневно (сутрин и вечер).

Котки:

0,3-0,5 см. паста 2 пъти на ден (сутрин и вечер), големи котки 1 см. паста 2 пъти на ден. Поставете директно върху езика на животното. Да се използва, докато не се постигне желания ефект.

CAT MALT

Съдържание в kg: Екстракти от малц: 585 g; Парафиново масло

50 g

Когато котките се мият те го правят с близане. Така могат да се образуват космени топки в стомаха. Това може да предизвика смущения в храносмилането, в резултат на което да се появи повръщане, обструкция (запушване на червата) или диария. Cat Malt също така стимулира апетита и затова е подходяща за котки, които са били болни или по някаква друга причина са намалили апетита.

Дозировка, метод и начини на приложение

2-3 см от Cat Malt се прилага перорално директно в устата 2-3 пъти дневно между храненията.

TRIM DOWN PASTE

Състав в 100g: Парафиново масло; Пшенично нишесте; Растително масло (Carthamus tinctorius L.) – CLA (конюгенирана линоленова киселина); Инулин от цикория; Малтодекстрин; Camellia Sinensis L екстракт от листа 1,63 g; Екстракт от артишок (Cynara scolymus L.) 0,03 g; Витамин E 0,25 g; Л-карнитин 0,20 g

50 g

Съставките на естествена основа помагат за намаляване на усвояването на мазнини от храната. Той също така подобрява метаболитния процес и мобилизирането на запасите от глюкоза и мазнини. Винаги се препоръчва като част от диета с контролиран прием на калории с редовни упражнения на домашния любимец. Пастата за управление на теглото Trim Down не е заместител на балансиращия фураж.

Дозировка и начин на приложение

Кучета:

Дайте 6-8 cm паста-гел (3-4 g) дневно на 10 kg телесно тегло, директно в устата.

Котки:

Давайте 3-4 cm паста-гел (1,5-2 g) дневно, директно в устата.



OMEGA 3 + 6 + 9 капсули

Съдържание в една капсула: Рибено масло; Растително масло (Borago officinalis L. & Olea europaea L); Желатин (говежди); Глицерин.
Omega 3:
EPA (Eicosa Pentaenoic acid): мин. 123 mg
DHA (Docosa Hexaenoic acid): мин. 82 mg
Omega 6:
GLA (Gamma Linolenic acid): мин. 20 mg
LA (Linolenic acid): мин. 34 mg
Omega 9:
OA (Oleic acid) мин. 27 mg

Кутия 4 x 10 капсули

Омега 3 + 6 + 9 капсули е допълващ фураж за кучета и котки с проблеми като: суха кожа, слаб растеж на козината, кожни раздразнения, пърхот, сърбеж и др. Съдържа важни полиненаситени мастни киселини.

Дозировка, метод и начини на приложение
Кучета: 1-2 капсули дневно на 10 kg телесно тегло.
Котки: 1 капсула дневно.





OMEGA 3 + 6 + 9 суспензия

Съдържание в ml: Vegetable oil; Brassica napuss L.: 0,85 ml; Oenothera Biennis L.: 0,06 ml; Borago officinalis L: 0,005 ml; Fish oil: 0,05 ml. Vitamin A 100 IU; Vitamin B6 100 mcg; Vitamin E 2,5 mcg; Biotin 4 mcg; Niacinamide 0,6 mg; Calcium-D-Pantothenate 0,5 mg; Zinc sulfate heptahydrate 4 mg.
Omega 3:
EPA(Eicosa Pentaenoic acid): min 55mg
DHA(Docosa Hexaenoic acid): min. 2mg
ALA (α- Linolenic acid): min. 2mg
Omega 6:
LA (Linolenic acid): min.178mg
GLA(Gamma Linolenic acid): min. 6mg
Omega 9:
OA (Oleic acid): min. 458mg

250 ml

Omega 3 + 6 + 9 е допълващ фураж за кучета и котки с проблемна кожа, като суха кожа, слаб растеж на козината, кожни раздразнения, пърхот, малки рани, сърбеж и т.н. Omega 3 + 6 + 9 е смес от Evening Primrose oil, Borage oil and Omega 3 oil, съдържа също и важни полиненаситени мастни киселини като EPA, DHA, GLA и линолова киселина. Ефектът се поддържа с добавяне на смес от витамини и цинк.

Дозировка, метод и начини на приложение:
Котки и кучета от малки породи 3 ml на 5 kg тегло на дневна база.
По-големите кучета от по-големи породи 5 ml на 10 kg от теглото на дневна база.
Разклатете добре бутилката и изсипете желаното количество на Омега 3 + 6 + 9 върху храната.



FLEXON PASTE

Съдържание в kg: Екстракт от малц, Глюкозамин (растителен, получен чрез ферментация), Метилсулфонил метан, Хондроитин сулфат (растителен, получен чрез ферментация), Сорбитол

180 g

Пастата Flexon съдържа хранителни вещества, които поддържат способността за движение и гъвкавост. Използвайте паста Flexon при скованост, болезненост, тежка физическа подготовка или старост.

Дозировка и начин на приложение
За орална употреба (директно в устата) или да се смесва с храната.
Дневна доза:
0-10 kg телесно тегло:
1/2 чаена лъжичка (приблизително 3 g)

10-20 kg телесно тегло:
1 чаена лъжичка (приблизително 6 g)

20-40 kg телесно тегло:
1 чаена лъжичка и 1/2 (приблизително 9 g)

40-60 kg телесно тегло:
2 чаени лъжички (приблизително 12 г)

Моля, обърнете внимание: дозата може да се намали наполовина, след приблизително 1 месец или според нуждите.



FLEXON COLLAGEN +

Съдържание в kg: Хидролизиран колаген (свински произход); Манганов сулфат монохидрат; Цинков оксид; Антиоксидант; Натриев аскорбат 9,8 g; Манган 150 mg; Цинк 200 mg

250 g

Подпомага здравето на ставите и подвижността.
Разработен като ежедневна хранителна добавка за кучета и котки. Продуктът съдържа хидролизирани колагенови пептиди като източник на протеин, както и добавени Vitamin C, манган и цинк за осигуряване на необходимите витамини и микроелементи. Подходящ е като добавка за активни и възрастни животни.

Дозировка и начин на приложение
1 мерителна лъжичка (изравнена) = 2 g.
Мерителна лъжичка е включена в опаковката.
Смесете Flexon Collagen+ с храната.
Дневна доза:
До 5 kg телесно тегло:
1 мерителна лъжичка.

Над 5 kg телесно тегло:
1 мерителна лъжичка на всеки 10 kg телесно тегло.







DIALYSIN PASTE

Съдържание в 50 g: Екстракт от малц; Декстроза; Amino acid: L-lysine 14,3 g

50 g

Овкусена паста за котки с L-лизин, която подпомага поддържането на нормалната имунна система. Също така ще подпомогне здравето на дихателните пътища, както и нормалното здраве на окото и неговата нормална функция.

Дозировка и начин на приложение
Да се приложи орално директно в устата или да се смеси с храната.

Котенца (на възраст до 6 месеца):
2-3 см паста два пъти на ден.

Възрастни котки:
5-6 см паста два пъти на ден.

UROLSYN PASTE GEL

Съдържание в kg: Екстракт от малц (ечемик); Растително масло (Brassica Napus L.); Калиева сол на органична киселина (лимонена киселина); DL-Methionine

50 g

Предназначение: намаляване на риска от образуване на нови струвитни камъни чрез подкисляване на пикочната киселина. Ниско съдържание на фосфор и магнезий.

Дозировка и начин на приложение
За подпомагане на разтварянето на струвитни камъни: дайте 3 cm паста-гел на 5 kg телесно тегло два пъти на ден в продължение на 5 до 12 седмици.
За подпомагане на бъбречната функция: 1-2 см паста-гел на 5 kg телесно тегло два пъти на ден до 6 месеца.
Дава се орално директно в устата или се смесва с храната. Винаги трябва да има достъп до питейна вода.

DIAHEP PASTE

Съдържание в kg: Малцов екстракт 609,5g; Растително масло (Brassica napus); Сушени водорасли (Chlorella vulgaris); Царевично нишесте; Vitamin E 10 g; L-карнитин хидрохлорид; Цинков оксид; Екстракт от бял трън (Silybum marianum); Екстракт от артишок (Cynara scolymus L.)Цинк 5 g; Мед 5 mg; Омега 3(Alfa Linolen acid) 12 g; Омега-6 25 g; Омега-9 80 g; Лесно смилаеми: Въглехидрати 23%; KJ/Kcal 14350KJ/3430kcal

50 g

Овкусена паста за подпомагане функцията на черния дроб и метаболитната функция. Препоръчва се за възрастни, слаби или затлъстели домашни любимци или по препоръка на ветеринарен лекар.

Дозировка и начин на приложение
Дава се перорално директно в устата или се смесва с храна за период до 6 месеца.
Котки:
0-5 kg телесно тегло: 2 ml дневно
5-10 kg телесно тегло: 2 ml сутрин и вечер.
Кучета:
0-5 kg телесно тегло: 2 ml дневно
5-20 kg телесно тегло: 2 ml сутрин и вечер
20-60 kg телесно тегло: 4 ml сутрин и вечер. Домашният любимец трябва да има постоянен достъп до питейна вода. Консултирайте се с ветеринарен лекар преди употреба или преди да удължите периода на употреба.







B-COMPLEX

Съдържание в една таблетка:
Дикалциев фосфат; Силициев диоксид (Equisetum arvense L.); Магнезиеви соли на мастни киселини; Vitamin B1: 500 mcg; Vitamin B2: 675 mcg; Vitamin B6: 300 mcg; Niacinamide 230 mcg; Calcium-D-Pantothenate 750 mcg

130 таблетки

Ежедневна добавка от В-витамини като допълващ фураж за кучета.
За предотвратяване на линеенето, за добро здравословно състояние, здрава и лъскава козина.

Дозировка и начин на приложение
Възрастни кучета: 1 таблетка дневно за 10 kg телесно тегло.
Малки кученца: 1 таблетка дневно за 5 kg телесно тегло.

KA-VITAL

Съдържание в една таблетка:
Vitamin K3: 30 mg

15 таблетки

Ежедневна добавка от Vitamin K. За подпомагане функцията на черния дроб и синтеза на протеини, важни за кръвосъсирването.

Дозировка и начин на приложение
Възрастни кучета: 1 таблетка дневно за 10 kg телесно тегло.
Кученца: 1 таблетка дневно за 5 kg телесно тегло.
Котки: 1 таблетка дневно.

VITAMIN C

Съдържание в една таблетка:
Vitamin C 7 mg

90 таблетки

Vitamin C , като добавка за кучета и котки.

Дозировка и начин на приложение
Кучета: 3 таблетки дневно на 10 kg телесно тегло.
Котки: 1 таблетка дневно







VITAMIN & MINERAL TABLETS + HERBS

Съдържание в една таблетка: Vitamin A: 450 IU; Vitamin B1: 200 mcg; Vitamin B2: 200 mcg; Vitamin B6: 100 mcg; Vitamin B12: 3 mcg; Vitamin C: 10 mg; Panthotenic acid 225 mcg; Niacinamide 900 mcg; Biotin 10 mcg; Vitamin D 45 IU; Vitamin E 5 mcg; Железен фумарат 4,57 mg; Меден оксид 473 mcg; Цинков оксид 630 mcg; Йод (калциев) 248 mcg; Дикалциев фосфат; Сол на мастни киселини; Магнезиев оксид; Водорасли (Bladderwrack):Екв. на 20 mg; Върбинка (Verbena officinalis) 1,96 mg; Екстракт от хибискус: Екв. на 1 mg; Екстракт от билка хвощ (Equisetum L) Екв.на 32 mg; Малтодекстрин; Ginseng biloba L.: Екв. до 7,3 mg (Gensenosider: 587 mcg); Echinacea purpurea MOENCH билков екстракт: Екв. до 37 mg; Ginko Biloba L.: Екв. до 1,97 mg (Гликозиди: 9,45 mcg); Екстракт от корен на коприва; (Urtica dioica L.) Екв. до 1 mg

90 таблетки

Ежедневна добавка от витамини, минерали и хелатни елементи. Идеална добавка с билки, за предотвратяване на линене и поява на пърхот, за здрави кости, стави, зъби, както и здрава и блестяща козина.

Дозировка и начин на приложение
1 таблетка дневно за 5 kg телесно тегло.
Не давайте допълнително Vitamin D като добавка без лекарско предписание.



KANAVIT CALCIUM & TRACE MINERALS

Съдържание в една таблетка: Vitamin D3: 45IU; Железен фумарат 1522 mcg; Меден оксид 1966 mcg; Манганов оксид 533 mcg; Калциев йодат 234 mcg; Цинков оксид 200 mcg; Дикалциев фосфат; Водорасли на прах; Магнезиеви соли на мастни киселини; Магнезиев оксид; Захароза; Царевично нишесте; Растително масло (кокосово/палмово масло)

100 таблетки

Добавка за ежедневна употреба за поддържане на костите, ставите и подобряване на двигателната способност на кучето.

Дозировка и начин на приложение
1 таблетка дневно на 10 kg телесно тегло. Дневната доза може да се удвои или утрои, ако ефектът на продукта не е в пълна сила, след приблизително 10 дни.



KANAVIT – VITAMIN & MINERAL

Съдържание в една таблетка: Vitamin A 450 IU; Vitamin B1: 200 mcg; Vitamin B2: 200 mcg; Calcium-D-pantothenate 225 mcg; Vitamin B6: 100 mcg; Vitamin B12: 3 mcg; Vitamin D3: 45 IU; Vitamin E: 5 mcg; Niacinamide 900 mcg; Zinc oxide; Manganese(ii)oxide; Copper sulphate pentahydrate; Iron(II)fumarate; Calcium iodate anhydrous. Дикалциев фосфат; Магнезиеви соли на мастни киселини; Магнезиев оксид; Захароза; Царевично нишесте; Малтодекстрин; Триглицериди на мастна киселина

100 таблетки



Добавка за ежедневна употреба с витамини, минерали, хелатни елементи. Идеална добавка за предотвратяване и избавяне от пърхота, както и за подпомагане на здрави кости, стави, зъби, както и здрава и лъскава козина.

Дозировка и начин на приложение
1 таблетка дневно на 5 kg телесно тегло.



PROTEVIT 37

Съдържание в kg: Vitamin A 800.000IU; Vitamin B1: 200mg; Vitamin B2: 200mg; Vitamin B6: 100mg; Calcium-D-Pantothenate 220mg; Vitamin B12: 3,3mg; Vitamin D3: 80.000IU; Vitamin E: 10g; Vitamin K3: 3mg; Vitamin C 10g; Ниацинамид 1,2g; Холин хлорид 1,2 mg; Фолиева киселина 20 mg; Биотин 5 mg; Таурин 6g; Цинков оксид; Манганов(II)оксид; Меден сулфат пентахидрат; Железен(II)фумарат; Безводен калциев йодат; Селенови дрожди (CNCM I-3399). Мляко на прах, декстроза, дикалциев фосфат, глюкозен сироп, захароза, царевично нишесте, калциев карбонат, триглицериди на мастни киселини, тринатриев цитрат, малтодекстрин

150 g



Protevit 37 е концентриран и оптимално допълващ фураж за домашни любимци. Той съдържа витамини, минерали, незаменими мастни киселини и протеини. Наред с другите неща, Protevit 37 поддържа добро състояние, здрава кожа и лъскава козина. Той е важна добавка за домашни любимци в растеж, бременни и кърмещи, животни, възстановяващи се от стрес или заболяване, както и при животни, които трябва да бъдат приведени в перфектно състояние и спортна кондиция.

Дозировка и начин на приложение
Мерителната лъжица се съдържа в опаковката.
1 доза (1 равна мерителна лъжичка) = прибл. 0,5 g
Смесете Protevit 37 в храната.

Указания за дневна доза:
Кученца: 2-5 дози
Възрастни кучета: 2-4 дози на 5 kg телесно тегло.
Котки: 2-5 дози
Птици, Морски свинчета, Зайци: 1 доза.
Коне (в зависимост от размера): 50-100 дози.
Моля, обърнете внимание: Protevit 37 не доставя дневната нужда от калций или фосфор.



VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6

Съдържание в kg: Vitamin A 410.000 IU; Vitamin B1: 50 mg; Vitamin B2: 250 mg; Vitamin B6: 50 mg; Vitamin B12: 125 mg; Ниацин 630 mg; Calcium-D-pantothenate 550 mg; Фолиева киселина 10 mg; Vitamin D3: 10.000 IU; Vitamin E 2750 mg; Биотин 20 mg; Zinc sulphate heptahydrate; Calcium iodate; Manganese sulphate monohydrate; Copper sulphate pentahydrate; Ferrous (II) fumarate; Taurine 1260 mg; Екстракт от розмарин; Цинк 75 mg; Йод 26 mg; Манган 75 mg; Мед 25 mg; Желязо 250 mg; Omega 6 – GLA (гама-линоленова киселина) 4 g; Енергия: 5400 kcal/22572 kJ

50 g

Стимулира апетита и затова е подходящ за котки, които са боледували или поради други причини имат намален апетит. Енергия за малки котенца и бременни или кърмещи котки. Идеален за поддържане на здрава и блестяща козина.

Дозировка и начин на приложение
2 cm паста-гел на ден. Употребява се перорално директно в устата или смесен с храна. Не давайте допълнително Vitamin D без съвет от ветеринарен лекар.



VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6

Съдържание в kg: Vitamin A 410.000 IU; Vitamin B1: 50 mg; Vitamin B2: 250 mg; Vitamin B6: 50 mg; Vitamin B12: 125 mg; Ниацин 630 mg; Calcium-D-pantothenate 550 mg; Фолиева киселина 10 mg; Vitamin D3: 10.000 IU; Vitamin E 2750 mg; Биотин 20 mg; Zinc sulphate heptahydrate; Calcium iodate; Manganese sulphate monohydrate; Copper sulphate pentahydrate; Ferrous (II) fumarate; Taurine 1260 mg; Екстракт от розмарин; Цинк 75 mg; Йод 26 mg; Манган 75 mg; Мед 25 mg; Желязо 250 mg; Omega 6 – GLA (гама-линоленова киселина) 4 g; Енергия: 5400 kcal/22572 kJ

50 g

Стимулира апетита и затова е подходящ за кучета, които са боледували или поради други причини имат намален апетит. Енергия за малки кученца и бременни или кърмещи кучки. Идеален за поддържане на здрава и блестяща козина.

Дозировка и начин на приложение
2 cm паста-гел за 5 kg телесно тегло на ден. За перорално приложение директно в устата или смесете с храната. Не давайте допълнително Vitamin D като добавка, без лекарско предписание.



VITAMIN & MINERAL ENERGY PASTE GEL + OMEGA 6

Съдържание в kg: Vitamin A 410.000 IU; Vitamin B1: 50 mg; Vitamin B2: 250 mg; Vitamin B6: 50 mg; Vitamin B12: 125 mg; Ниацин 630 mg; Calcium-D-pantothenate 550 mg; Фолиева киселина 10 mg; Vitamin D3: 10.000 IU; Vitamin E 2750 mg; Биотин 20 mg; Zinc sulphate heptahydrate; Calcium iodate; Manganese sulphate monohydrate; Copper sulphate pentahydrate; Ferrous (II) fumarate; Taurine 1260 mg; Екстракт от розмарин; Цинк 75 mg; Йод 26 mg; Манган 75 mg; Мед 25 mg; Желязо 250 mg; Omega 6 – GLA (гама-линоленова киселина) 4 g; Енергия: 5400 kcal/22572 kJ

100 g

Стимулира апетита и затова е подходящ за кучета, които са боледували или поради други причини имат намален апетит. Енергия за малки кученца и бременни или кърмещи кучки. Идеален за поддържане на здрава и блестяща козина.

Дозировка и начин на приложение
2 cm паста-гел за 5 kg телесно тегло на ден. За перорално приложение директно в устата или смесете с храната. Не давайте допълнително Vitamin D като добавка, без лекарско предписание.



LACTIC TABLETS OMEGA FISH

Съдържание в една таблетка: Vitamin B1: 1,0 mg; Vitamin B2: 1,0 mg; Vitamin B6: 800 mcg; Vitamin B12: 4,0 mcg; Ниацинамид 9,0 mg; Калциев-D-пантотенат 800 mcg; Цинков оксид 3,1 mg; Желязо 28,0 mcg; Мед 1,5 mcg; Цинк 2,5 mg; Калций 90 mg; Фосфор 68 mg; HA + EPA min. 0,45 mg; Дикалциев фосфат; Мляко на прах; Рибено масло на прах; Магнезиеви соли на мастни киселини; Малтодекстрин; Натриев цитрат; Царевично нишесте захароза; Натриеви соли на органични киселини

100 таблетки

Омега рибен вкус. Вкусен, с висока биологична стойност, богат на Vitamin B, микроелементи и протини, придава красиво гъста и лъскава козина.

Дозировка и начин на приложение

Котенца:

1-2 таблетки дневно.

Възрастни котки:

2-4 таблетки дневно.



LACTI KITTEN

Съдържание в kg: Мляко на прах. Vitamin A 32 000 IU; Vitamin D3: 1600 IU; Vitamin E 85 mg; Vitamin K3: 1,0 mg; Vitamin B1: 10 mg; Vitamin B2: 4,0 mg; Vitamin B6: 3,6 mg; Vitamin B12: 95 mcg; Nicotinic acid 50 mg; Pantothenic acid 7,54 mg; Folic Acid: 0,98 mg; Biotin 240 mcg; Vitamin C 52 mg; Iron 76,35 mg; Manganese 8,07 mg; Copper 12,28 mg; Zinc 80 mg; Iodine 1,6 mg; Selenium 0,1 mg; Calcium 11,50 mg; Phosphorus 8 g; Sodium 4 g; Magnesium 2.6 g; Potassium 10 g; Lysine 21 g; Methionine 6,75 g; Енергия 3500 kcal/kg

300 g

Млекозаместител за новородени котенца.


Дозировка и начин на приложение

100 ml млекозаместител: 20 g прах (1 мерителна лъжичка = 5 g) се разтваря в 80 ml охладена, преварена вода (около 45-50 °C).

Разбъркайте внимателно и го охладете до 37-38 °.

Сместа може да издържи до 24 часа в хладилник.

Брой хранения: 0-7 ден на всеки 2-3 часа; 8-14 ден на всеки 3-4 часа; 15-28 ден на всеки 4-6 часа.



LACTI PUPPY

Съдържание в kg: Мляко на прах. Vitamin A 32 000 IU; Vitamin D3: 1600 IU; Vitamin E 85 mg; Vitamin K3: 1,0 mg; Vitamin B1: 10 mg; Vitamin B2: 4,0 mg; Vitamin B6: 3,6 mg; Vitamin B12: 95 mcg; Nicotinic acid 50 mg; Pantothenic acid 7,54 mg; Folic Acid: 0,98 mg; Biotin 240 mcg; Vitamin C 52 mg; Iron 76,35 mg; Manganese 8,07 mg; Copper 12,28 mg; Zinc 80 mg; Iodine 1,6 mg; Selenium 0,1 mg; Calcium 11,50 mg; Phosphorus 8 g; Sodium 4 g; Magnesium 2.6 g; Potassium 10 g; Lysine 21 g; Methionine 6,75 g; Енергия 3500 kcal/kg

500 g

Млекозаместител за новородени кученца.

Дозировка и начин на приложение

100 ml млекозаместител: 20 g прах (1 мерителна лъжичка = 6,5 g) се разтваря в 80 ml охладена, преварена вода (около 45-50 °C). Разбъркайте внимателно и го охладете до 37-38 °.

Сместа може да издържи до 24 часа в хладилник.

Брой хранения: 0-7 ден на всеки 2-3 часа; 8-14 ден на всеки 3-4 часа; 15-28 ден на всеки 4-6 часа.

Когато кученцето е вече на около 4 седмици, преминете плавно към твърда храна.



DIACALM TABLETS

Съдържание в една таблетка: Екстракт от корен на валериана (Valeriana officinalis L.) екв. към 200 mg корен от растението; Екстракт от корен на джинджифил (Zingiber officinalis) екв. до 37 mg корен от растението; Аминокиселина (L-триптофан) Дикалциев фосфат; Магнезиеви соли на мастна киселина; малтодекстрин; Царевично нишесте

30 таблетки

Натурално и добре познато билково средство, за подпомагане успокояването и комфорта на домашни любимци при стресови ситуации, като: пътуване, нова среда, фойерверки, гръмотевични бури и т.н.
Diacalm tablets съдържа също триптофан, който е незаменима аминокиселина, за която е известно, че облекчава стреса и помага за намаляване на импулсивното поведение и агресия при кучета и котки.

Дозировка и начин на приложение
Приложете един час преди стресовата ситуация:
Кучета: 2-3 таблетки на 10 kg тегло,
Котки: 1 таблетка на котка.
Препоръчва се да се използва за ограничен период от време от 2-3 седмици и максимум два пъти дневно.



DIACALM PASTE

Съдържание в 30 ml: Екстракт от корен на валериана(Valeriana officinalis L.) екв. до 161 mg растителен корен; Екстракт от корен на джинджифил (Zingiber officinalis) екв. до 16 mg растителен корен; Аминокиселина (L-Tryptophan) 75 mg; Екстракт от малц 25,5 mg

30 ml

Натурално и добре познато билково средство, което помага на домашните любимци да се отпуснат и да се успокоят при стресови ситуации като: пътувания, изложби за домашни любимци, нова среда, престой в развъдници (хотели), фойерверки, гръмотевични бури и др.
Diacalm relaxing paste съдържа също триптофан, който е незаменима аминокиселина, за която е известно, че облекчава стреса и помага за намаляване на импулсивното поведение и агресия при кучета и котки.

Дозировка и начин на приложение
Прилагайте един час предварително:
Кучета: 4-6 ml паста на 10 kg телесно тегло
Котки: 2-3 ml на котка.
Препоръчва се употребата за ограничен период от 2-3 седмици и се прилага максимум два пъти на ден. Давайте DIACALM paste като перорална добавка директно в устата или разбъркайте с храната.



VITAMIN SYRUP ЗА ЗАЙЦИ & ГРИЗАЧИ

Съдържание в kg: Vitamin A 1250000 IU; Vitamin D3: 125000 IU; Vitamin E 750 mg; Vitamin B1: 1500 mg; Vitamin B2: 1500 mg; Vitamin B6: 1000 mg; Vitamin B12: 1500 mcg; Vitamin C 25 000 mg; Vitamin K3: 250 mg; Nicotinic acid 3000 mg; Pantothenic acid 3000 mg; Folic acid 15 mg; Малтитол; Вода; Сорбитол.

15 ml

Съдържа важни хранителни вещества и витамини, за да помогнат за общо здравословно състояние, имунната система и жизненост.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба.
Хамстери, мишки, плъхове и др.: 2-6 капки на ден.
Морските свинчета, зайци, чинчили и др.: 8-15 капки на ден.
Смесете в питейната вода или храната.



DIGEST BALANCE ЗА ЗАЙЦИ & ГРИЗАЧИ

Съдържание в kg: Kobalt chloride 0,2 mg; Copper sulfate: 0,2 mg; Magnesium sulfate: 1 mg; Вода, Tannin; Разрешени от ЕС консерванти, минерали

15 ml

За подпомагане на възстановяване от стомашни разстройства, причинени от стрес, грип, промяна на клетка / околна среда, климатични вариации и т.н.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба.
Дайте 10-12 капки в 20 ml вода за пиене или миксирайте в храната.







LIQUID MINERALS ЗА ЗАЙЦИ & ГРИЗАЧИ

Съдържание в kg: Натриев дихидроген фосфат; Магнезиев хлорид; Vitamin C 200 mg; Цинк 150 mg; Мед 150 mg

15 ml

За подобряване качеството на водата чрез осигуряване на важни минерали.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба.
Морски свинчета, зайци, чинчили и др.: 6 – 10 капки
Хамстери: 3 – 4 капки
Мишки, плъхове и др.: 2 – 6 капки.
Давайте ежедневно в прясна питейна вода.



VITAMIN C PULVIS ЗА МОРСКИ СВИНЧЕТА

Съдържание в 3,5 g: Vitamin C 100 mg; Декстроза; Калциев карбонат

50 g

Морските свинчета не образуват сами Vitamin C. Следователно Vitamin C трябва да се доставя чрез храната.

Дозировка и начин на приложение
Препоръчителната дневна доза е 10-16 mg на килограм телесно тегло. По време на бременност 30 mg на килограм телесно тегло.



VITAMIN C LIQUID ЗА МОРСКИ СВИНЧЕТА

Съдържание в kg: Малтоза; Сорбитол; Малтодекстрин; Екстракт от ацерола (Malpighia punicifolia L.); Биофлавоноиди (екстракт от плодове на Citrus aurantium L) 1500 mg; Vitamin C 35 000 mg

15 ml

Морските свинчета не образуват сами Vitamin C. Осигурете Vitamin C, екстракт от ацерола и цитрусови биофлавоноиди.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Давайте по 5-8 капки на ден. По време на бременност 16 капки на ден. Дайте във водата за пиене или смесете с храната.







VITAMIN SYRUP ЗА ПТИЦИ

Съдържание в kg: Малтитол; Вода; Сорбитол; Vitamin A 1 250 000 IU; Vitamin D3: 125 000 IU; Vitamin E 750 mg; Vitamin B1: 1500 mg; Vitamin B2: 1500 mg; Vitamin B6: 1000 mg; Vitamin B12: 1500 mcg; Vitamin C 25 000 mg; Vitamin K3: 250 mg; Nicotinic acid 3000 mg; Pantothenic acid 3000 mg; Folic acid 15 mg

15 ml

Важни хранителни вещества за декоративни птици, за подкрепа на общото здравословно състояние и имунната система и насърчаване на пеенето.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Малки папагали и канарчета: 5-6 капки на ден. Корели и големи папагали: 8-15 капки на ден. Дайте във водата за пиене или смесете с храната.



DIGEST BALANCE ЗА ПТИЦИ

Съдържание в kg: Вода, Tannin; Kobalt chloride 0,2 mg; Copper sulfate 0,2 mg; Magnesium sulfate 1 mg

15 ml

За подпомагане на възстановяването от стомашни разстройства при декоративни птици, причинени от стрес, грип, промяна на клетка/околна среда, климатични вариации и т.н.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Дайте 3-4 капки в 20 ml вода за пиене или миксирайте в храната.



LIQUID MINERALS ЗА ПТИЦИ

Съдържание в kg: Натриев дихидроген фосфат; Магнезиев хлорид; Vitamin C 200 mg; Цинк 150 mg; Мед 150 mg

15 ml

За подобряване качеството на водата чрез осигуряване на важни минерали.

Дозировка и начин на приложение
Давайте: 5-6 капки в прясна питейна вода дневно.





MOULT SUPPORT ЗА ПТИЦИ

Съдържание в kg: Полиолер (малтитол); Сорбитол; Декстроза (глюкоза); Захароза; Царевично нишесте; Триглицериди на мастна киселина; Калциев фосфат Малтодекстрин; Vitamin A 310 000 IU; Vitamin D 31 200 IU; Vitamin E 225 mg; Vitamin B1: 350 mg; Vitamin B2: 330 mg; Vitamin B6: 245 mg; Vitamin B12: 450 mcg; Vitamin C 7500 mg; Vitamin K 75 mg; Ниацинамид 900 mg; Калциев-D-пантотенат 900 mg; Фолиева киселина 1 mg; Железен (II) фумарат; Меден сулфат пентахидрат; Манганов сулфат монохидрат; Цинков сулфат хептахидрат; Мед 19 mg; Желязо 3 mg; Манган 39 mg; Цинк 8 mg

15 ml

За краткосрочно допълнително снабдяване с витамини и минерали. Доставя важни хранителни вещества по време на периода на линеене и подпомага поддържането на перата и общото здраве.

Дозировка и начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Папагали и канарчета: 5-6 капки на ден. Корели и папагали: 15 - 30 капки на ден. Дайте във водата за пиене или смесете във фуража.



VITAMIN & MINERALS ЗА ПТИЦИ & ВЛЕЧУГИ

Съдържание в kg: Дикалциев фосфат; Декстроза Калциев карбонат; Натриев хлорид; Магнезиев оксид Захароза; Малтодекстрин; Царевично нишесте; Триглицериди на мастна киселина; Vitamin A 300 000 IU; Vitamin B1: 30 mg; Vitamin B2: 120 mg; Vitamin B6: 10 mg; Vitamin B12: 500 mcg; Vitamin D3: 40 000 IU; Vitamin E 500 mg; Vitamin K3: 30 mg; Холин хлорид 1500 mg; Калциев-D-пантотенат 300 mg; Фолиева киселина 10 mg; Ниацинамид 600 mg; Цинков оксид; Железен (II) фумарат; Манган (II) оксид; Меден сулфат пентахидрат; Безводен калциев йодат; L-лизин монохидрохлорид 20 000 mg; DL-метионин 10 000 mg

50 g

Витамини и минерали под формата на пулвис за птици и влечуги.

Дозировка и начин на приложение
Мерителна лъжичка (1 ml = 1 g).
1-2 равни мерителни лъжички на 200 g фураж.
Смесете във фуража.



CHLORHEX 0,5 % SHAMPOO

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamide DEA, Chlorhexidine, Digluconate, PEG-120 Methyl Glucose Dioeate

150 ml

Шампоан с хлорхексидин за домашни любимци, предназначен за дълбоко почистване на кожата.

Начин на приложение

Моля пазете ушите защитени евентуално с памучни тампони. Масажирайте с шампоана в мократа кожа. Избягвайте попадане на шампоан в очите. Оставете за 2-3 минути. Изплакнете обилно. Използвайте кърпа за да отстраните излишната вода. Моля, обърнете внимание домашният любимец да не е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



CHLORHEX 4 % SHAMPOO

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Chlorhexidine Digluconate, Cocamide DEA, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate

150 ml

Изключително дълбоко почистващ и грижовен шампоан за домашни любимци.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мокра козина и оставете за 2-3 минути. Изплакнете обилно. Избягвайте попадане на шампоана в очите. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание домашният любимец да не е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



DANDRUFF SHAMPOO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Propylene Glycol, PEG-10 Olive Glycerides, Cocamidopropyl Betaine, Zinc Pyrithione, Salicylic Acid, Polyquaternium-10, Parfum, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

150 ml

Шампоан за домашни любимци с пърхот.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мокра козина и оставете за 2-3 минути. Изплакнете обилно. Избягвайте попадане на шампоана в очите. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание домашният любимец да не е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



BENZOYLIC PEROXIDE SHAMPOO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Colloidal Silica, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Benzoyl peroxide, Citric Acid, Tromethamine, Benzyl Alcohol, Magnesium Aluminium Silicate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

150 ml

Шампоан, осигуряващ подхранване на животни с мазна кожа. Необходимо е използването на балсам след измиване.

Начин на приложение

Моля пазете ушите, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мократа кожа и оставете за 2-3 минути. Избягване попадане на шампоан в очите. Изплакнете обилно. Използвайте кърпа за да отстраните излишната вода. Срешете козината добре, когато е почти суха. Моля, не оставяйте животното в студени или ветровити стаи, докато козината не е напълно суха.





MILD & SENSITIVE SHAMPOO

Aqua, Disodium Laureth, Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl, isostearate, Polyquaternium-10, Citric Acid, Phenoxyethanol, Potasium sorbat, Ethylhexylglycerin

150 ml

Изключително мек, грижовен и подхранващ шампоан за кучета и котки с чувствителна кожа.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мокра козина и оставете за 2-3 минути. Изплакнете обилно. Избягвайте попадане на шампоана в очите. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание домашният любимец да не е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



2 in 1 SHAMPOO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamide Betaine, PEG-10 Olive Glicerides, Polyquatenium – 10, Glycerol Stearate, Cocamide MEA, Propylen Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Perfume

250 ml

Специално разработен шампоан за всички породи кучета и котки. Овлажняващ и подхранващ козината и кожата. Особено подходящ за породи с дълга козина, оставящ козината мека, плътна и лесна за разресване.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мокра козина и оставете за 2-3 минути. Изплакнете обилно. Избягвайте попадане на шампоана в очите. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание домашният любимец да не е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



DOG SHAMPOO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium chloride, PEG-15 Glvcervl lsostearate, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis leaf Juice, Panttienol, Parfum, Ethylhexyglyterin

250 ml

Специално разработен шампоан за всички породи кучета, хидратиращ с грижа за козината и кожата.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мократа козина. Избягвайте попадане на шампоан в очите. След нанасяне, оставете за 2-3 минути и след това изплакнете обилно. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание, че домашният любимец не трябва да е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



CAT SHAMPOO

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamide Betaine, PEG-10 Olive Glicerides, Polyquatenium – 10, Glycerol Stearate, Cocamide MEA, Propylen Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Perfume

250 ml

Специално разработен шампоан за всички породи котки, хидратиращ с грижа за козината и кожата.

Начин на приложение

Моля, пазете ушите защитени, евентуално с памучни тампони. Масажирайте шампоана в мократа козина. Избягвайте попадане на шампоан в очите. След нанасяне, оставете за 2-3 минути и след това изплакнете обилно. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание, че домашният любимец не трябва да е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



CONDITIONER

Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetrimonlum Chloride, Cyclomelhicone, Dimetnicone, Caprylic Triglyceride, Capric Triglyceride, Parfum, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchlorosothiazolinone, Methylisothiazolinone

250 ml

Балсам за всички домашни любимци. Прави козината мека, плътна и лесна за разресване.

Начин на приложение

Измийте домашния любимец с шампоан и изплакнете обилно. Необходимото количество балсам се разрежда в 100 ml хладка вода и се масажира в козината. Оставете за 1-2 минути. Изплакнете обилно. Използвайте кърпа, за да отстраните излишната вода. Срешете добре козината, когато е почти суха. Моля, обърнете внимание, че домашният любимец не трябва да е настанен в студени или ветровити помещения, докато козината не е напълно суха.



VEPCO SHAMPOO

Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Keratin Amino Acids, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Hydroxypropylgluconamide, Hydroxypropylammonium Gluconate, Parfum, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua Seed Extract, Zea Mays Starch, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-7, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Coumarin

500 ml

Специален шампоан инспириран от шампоан за коне.

Начин на приложение

Нанесете на мокра коса с масажни движения до образуване на хомогенна пяна. Изплакнете обилно с вода. Да се пази от очи!



EAR CLEANER

Пропилен гликол, вода, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, натриев лаурет сулфат, натриев стеарат

50 ml

А хидратиращ лосион – Ear Cleaner за котки, който внимателно разтваря мръсотията и ушната кал, облекчава раздразненията в ухото. Това ще предотврати надраскване при евентуално механично почистване, което може да доведе до инфекции.

Начин на приложение
Изстискайте 5-10 капки от Ear Cleaner в ухото. Нежно масажирайте основата на ухото, преди да позволите на котката да си разтърси главата. Накрая избършете всяка видима мръсотия и ушна кал с памук. Не използвайте Ear Cleaner върху рани.



EAR CLEANER

Aqua, Propylene Glycol, Alcohol, Isopropyl Alcohol, Potassium Sorbate, Menthol, Thymol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

50 ml | 100 ml

А хидратиращ лосион – Ear Cleaner за кучета, който внимателно разтваря мръсотията и ушната кал, облекчава раздразненията в ухото. Това ще предотврати надраскване при евентуално механично почистване, което може да доведе до инфекции.

Начин на приложение
Изстискайте 5-10 капки от Ear Cleaner в ухото. Нежно масажирайте основата на ухото, преди да позволите на кучето да си разтърси главата. Накрая избършете всяка видима мръсотия и ушна кал с памук. Не използвайте Ear Cleaner върху рани.



EYE CLEANER

Aqua, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride

50 ml | 100 ml

Използва се, когато има люспи и мръсотия около очите. Може да се използва за всички животни.

Начин на приложение
Моля, наблюдавайте дали има инфекции или други признаци, които изискват ветеринарна помощ. Избършете околоочния слой с памучен тампон, навлажнен с Eye Cleaner. Почиствайте зоната около очите 1-2 пъти седмично или при необходимост.



ORAFITAL

Aqua, Citric Acid, Chlorhexidine Digluconate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma.

50 ml

Спрей за устна хигиена и избелване на зъбите.
Помага за защита срещу плака и бактерии, освежава дъха и противодейства на кариес. Подсилва и предпазва венците.

Начин на приложение
Да се разклаща добре преди употреба. Напръскайте директно върху зъбите / венците два пъти дневно или колкото е необходимо. Оставете за 1-2 минути и изплакнете с чиста вода.



TOOTH PASTE HERBAL

Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerin, Carraganan, Chlorhexidine Digluconate, Potassium Sorbate, Propylene Glucol, Glucoamylase, Mentha Spicata Herb oil, Salvia Lavandulifolia L. Herb oil, Commiphora Myrrha oil, Sodium sorbate, Phenoxyethanol.

75 g

Паста за зъби с билки.

Начин на приложение
Използвайте нормална, мека четка за зъби. Четкайте зъбите на кучето с малки кръгови движения, без да натискате прекалено силно. Изплакнете зъбите на кучето с чиста вода след измиването им. Почиствайте ежедневно или колкото е необходимо.



TOOTH PASTE ENZYMES

Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerine, Carageenan, Chlorhexidiene Digluconate, Glucose-oxidase, Glyco-amylase.

75 g

Паста за зъби с ензими.

Начин на приложение
Използвайте нормална, мека четка за зъби. Четкайте зъбите на кучето с малки кръгови движения, без да натискате прекалено силно. Изплакнете зъбите на кучето с чиста вода след измиването им. Почиствайте ежедневно или колкото е необходимо.





OROZYME GEL

Ензимен комплекс: амилаза, глюкоза оксидаза, калиев тиоцианат, лактоферин, лактопероксидаза, лизозим, супероксид дисмутаза – лек абразив – нейонен сърфактант – аромат

70 g

листовка

За поддържане на добра хигиена на устната кухина и зъбите при кучета и котки.

Начин на приложение
Прилагайте веднъж дневно.
Кучета: Нанесете директно в устата или смесете с малко количество храна.
Котки: Нанесете директно в устата или върху лапата на котката, за да може котката да оближе.
Предлага се дюза, която улеснява прилагането при котки и малки кучета.
Доза:
Котки и малки кучета: около 1 см гел.
Кучета под 20 kg: около 2 см гел.
Кучета над 20 kg: около 5 см гел.

С четкане: Нанесете директно върху повърхността на зъбите и венците с помощта на затворената четка за пръсти или четка за зъби.



OROZYME ENZYME STRIPS

Говежда сурова кожа, хидролизиран царевичен глутен, суроватка на прах (естествен източник на лактопероксидаза и лактоферин)

S 244 g | M 141 g | L 141 g

листовка

За поддържане на добра хигиена на устната кухина и зъбите при кучета.
OROZYME® Oradental ензимни колагенови ленти допълват действието на OROZYME® гел за устна хигиена. Използвани ежедневно, OROZYME® Oradental ензимни колагенови ленти и OROZYME® гел за устна хигиена помагат за предотвратяване натрупването на плака, което може да доведе до зъбен камък и лош дъх.

Начин на приложение
Препоръчва се да се дъвче всяка вечер след последното хранене.
Освен това се препоръчва ежедневното миене на зъбите с OROZYME® гел за устна хигиена.
За кучета с тегло под 10 kg:
Използвайте OROZYME® S ензимни колагенови ленти за малки породи кучета.
За кучета с тегло от 10 - 30 kg:
Използвайте OROZYME® M ензимни колагенови ленти за средни породи кучета.
За кучета с тегло над 30 kg:
Използвайте OROZYME® L ензимни колагенови ленти за големи породи кучета.



VIOCID SPRAY

Chlorhexidine gluconate 250 mg
Methylrosaline chloride 40 mg

200 ml

Антисептичен спрей при локални кожни лезии, панарициум, операционни рани, охлузвания, одраскване, порезни и ухапни рани, изгаряния и за дезинфекция на пъпната връв.

Начин на приложение
Да се разклати преди употреба. Мястото на приложение се почиства от гнойни и ексудативни материи. Напръскайте от разстояние 20 см. Повторете приложението след 6 до 12 часа. Извършват се максимално 6 апликации.



DERMAZYM SPRAY

Trypsin 0.12 mg
Peru balsam 87.0 mg
Castrol Oil 87.38 mg

200 ml

Спомага за отстраняването на гной, мъртва и разлагаща се тъкан и стимулира бързото заразтване на рани, язви и абсцеси с минимални белези от раните.

Начин на приложение
Само за локално приложение. Разклатете добре флакона преди употреба. Дръжте флакона изправен на около 10 см от кожата и пръскайте засегнатото място 2-3 пъти дневно.



ALUDERM SPRAY

Алуминиев прах, Етилацетат, Пропан-бутанова пропелентна газова смес, Разтворители

200 ml

Алуминиев спрей с филмообразуващо действие за животни, предназначен да предпазва чувствителната кожа от замърсявания и неблагоприятни външни влияния.

Начин на прилагане
Разклатете флакона енергично преди употреба. Почистете засегнатите кожни участъци и прилагайте 2–3 пъти дневно чрез напръскване от разстояние 20–30 cm.



PUDERM SPRAY

Масло от риган (Карвакрол), Калциев стеарат, Цинков оксид, Пропан-бутанова пропелентна газова смес, Разтворители

200 ml

Микрофин прахообразен спрей за защита и поддръжка на чувствителни и натоварени кожни участъци при животни. Подпомага естествената регенерация на кожата и козината. Съдържащият се прах изсушава напръсканата кожна повърхност.

Начин на приложение

Разклатете енергично преди употреба, докато вътрешната стоманена сачма напълно разбърка праха.

Почистете засегнатите участъци и напръсквайте 2–3 пъти дневно от разстояние 10–20 см.



BLUEDERM SPRAY

Масло от риган (Карвакрол), Декспантенол, Полисорбат, Синя оцветяваща смес, Пропан-бутанова пропелентна газова смес, Разтворители

200 ml

Синьо-оцветяващ спрей за поддържане на кожата и копитата при животни. Осигурява протекция и поддържаща грижа за силно натоварени, увредени и чувствителни кожни участъци.

Начин на приложение

Разклатете флакона енергично преди употреба.

Почистете засегнатите кожни участъци и прилагайте 2–3 пъти дневно чрез напръскване от разстояние 20–30 cm.



ZINCODERM SPRAY

Алантоин, Ланолин, Цинков оксид, Пропан-бутанова пропелентна газова смес, Разтворители

200 ml

Спрей с унгвентна основа за подпомагане на естествената регенерация на кожата при животни. Предпазва кожата от дехидратация. Действа като мехлемна превръзка и осигурява защита срещу неблагоприятни фактори на околната среда, участващ в процесите на епителизация и възстановяване на кожата.

Начин на приложение

Разклатете флакона енергично преди употреба до пълна хомогенизация на суспензията (чрез вградената сачма). Почистете засегнатите участъци и прилагайте 2–3 пъти дневно чрез напръскване от разстояние 10–20 cm.



PODODERM SPRAY

Масло от лавър, Масло от черен дроб на треска, Пропан-бутанова пропелентна газова смес, Маркираща боя, Разтворител

200 ml



Черен, маслен спрей с филмообразуващо действие за поддръжка на всички видове рогови тъкани.

Начин на приложение

Разклатете добре преди употреба, докато вътрешната стоманена сачма напълно смеси компонентите. Напръскайте от разстояние около 10 cm върху чиста и суха рогова тъкан.



CLORHEXIDINE SPRAY

Aqua, Sodium Acetat, Chlorhexidien Diacetat, Acetic Acid

50 ml



Спрей за дезинфекция и почистване. За поддържане здравето на кожата, в случай на драскотини и малки рани.

Начин на приложение

При по-големи рани и наранявания трябва да посетите вашия ветеринарен лекар. Внимателно отстранете космите, мръсотията, повредена тъкан и т.н. преди да приложите продукта. Напръскайте директно върху нараненатa зона 2 пъти дневно или колкото е необходимо, докато оздравее. Не се изплаква с вода след приложение.



SENSI LOTION

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) extract, Methyl Gluceth- 20, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Glycerin, Olus, Cyclomethicone, Tocopherol, Bytyrospermum Parkii (Shea Butter), Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Chamomilla recutita (Camomille) extract, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) extract, Urtica Dioica (Nettle) extract, Camillia Sinensis (Green Tea) extract, Juniperus Communis (Juniper) extract, Ethyl hexylg lycerin

50 ml



Sensilotion е специална смес от лосиони, съдържаща полезни билкови съставки за синергична защита, омекотяване и укрепване на стресирана или чувствителна кожа. Без парфюм. Sensilotion е много подходящ като нежен лосион без алкохол, но също така полезен за сухи, чувствителни, раздразнени, възпалени или стресирани участъци от кожата, които се нуждаят от специално внимание. Примери могат да бъдат: стресирани и разранени възглавнички (леки изгаряния от горещи пътища през лятото), при лечение за успокояване на кожата след ухапвания от насекоми и т.н.

Начин на приложение

Нанасяйте 1-2 пъти дневно или колкото е необходимо върху засегнатите кожни участъци и масажирайте нежно в кожата. Нанесете повторно, в случай че Sensilotion се абсорбира бързо, за да насити достатъчно кожата.



ZINC + LAVENDER

Zinc oxide, Glycerin, Lavandula Angustifolia Flower Oil

100 g

Хигиенен (козметичен) мехлем за кожа. При раздразнена, суха кожа. Мехлемът се използва при кожни лезии. Идеален за суха, напукана кожа, нормализира физиологичните функции на кожата и я подхранва. Етеричното масло от лавандула, съдържащо се в мехлема подпомага заздравяването.

Начин на приложение
Нанасяйте върху проблемните участъци от кожата 2-3 пъти на ден. Да се съхранява на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина при температура до +25°C.



SPOROZON

Aqua, Cetostearyl Alcohol, Petrolatum, Urea, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Eugenia Caryophyllus (Clove) Oil, Polysorbate 20, Cetrimide, Triethanolamine

80 g

Хигиенен (козметичен) крем за кожа. SPOROZON се препоръчва да се използва като козметичен крем след проведено лечение на гъбични инфекции на кожата (дерматомикози), причинени от дерматофити и в случай на лишеи. Основните съставки на крема са натурално етерично масло от карамфил, което се отличава със силните си специфични свойства и цетримид, спомагащи за бързото регенериране на кожата на животните, засегната от дерматомикози.

Начин на приложение
Кремът е само за ветеринарномедицинска и външна употреба. Нанесете малко количество на дебел слой от крема върху засегнатата област. След 3-4 дни е препоръчително да отстраните с помощта на шпатула образувалата се кора и да нанесете отново крема. Препоръчва се да се превърже зоната след прилагане на мехлема, ако това е възможно. Не трябва да се използва при животни, които са алергични към някоя от съставките на продукта.



GREEN PLUS GEL

Aqua, Alcohol Denat., Menthol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Camphor, Glycerin, Polysorbate 20, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine

100 g

Масажен гел с ментол, евкалипт и камфор за продуктивни и непродуктивни животни.

Начин на приложение:
Нанесете малко количество от гела в тънък слой и го втрийте добре в желания участък 2-3 пъти дневно. Не трябва да се прилага върху отворени рани. Не трябва да се използва при животни, които са алергични към някоя от съставките на GREEN PLUS GEL.



BITTER SPRAY

Aqua, Denatonium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium sorbate

100 ml

Горчив спрей, който противодейства на облизването на рани, гризането на козината, скубането на пера, сваляне на превръзката и др.

Начин на приложение
Да се пръска върху засегнатата област. Повторете, ако е необходимо. Не пръскайте в очите.



GO AWAY SPRAY

Aqua, Polysorbate 20, Methyl Nonyl Ketone, Phenoxyethanol, Potassium sorbate, Ethylhexylglycerin

100 ml

Осигурява неприятна миризма за кучета и котки. Използва се, за да обезсърчи животните да останат в и около даден район и да им попречи да замърсят дома и градината ви. Урината и фекалиите трябва да се отстранят и зоната да се почисти добре.

Начин на приложение
Разклатете преди употреба. Ако желаете или ако е необходимо, напръскайте върху кърпа и поставете близо до растения или предмети, които искате да защитите. Напръскайте обилно и докато се овлажни леко. Използвайте ежедневно или според нуждите. Изберете няколко точки в района, в който използвате Go Away spray. По време на топло време и/или когато районът е бил силно замърсен, се препоръчва по-честа употреба за най-добри резултати. Не пръскайте директно върху животни.



CATNIP SPRAY

Aqua, Alcohol, Polysorbate 20, Valeriana officinalis root extract, isopropyl alcohol, Phenoxyethanol, Potassium sorbate, Ethylhexylglycerin, Nepeta Cataria Oil

100 ml

Атрактант с валериана за котки Осигурява характерна ароматна миризма, която има уникален ефект и пленителност при семейство котки, особено при мъжките. Повечето възрастни котки – но не при котенца до приблизително 6-месечна възраст смятат, че CatNip spray е неустоим.

Начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Напръскайте върху играчки и котешкото дюшече, за да го привлечете и му доставите удоволствие. Напръскайте върху драскала, за да насърчите котката да го използва. Не пръскайте директно върху животни.



BITCH SPRAY

Aqua, Bad Odor Remover complex

100 ml

Обезсърчава нежеланото внимание от други кучета, докато кучката е разгонена.

Начин на приложение
Разклатете преди употреба. Напръскайте директно върху вулвата и околностите ѝ няколко пъти дневно през периода на разгонване. За най-добри резултати използвайте Bitch spray няколко дни преди началото на разгонване и продължете да го използвате при необходимост - няколко пъти дневно през сезона на разгонване на кучката.



FORESKIN CLEANER

Glycerol, Aqua, Phenoxyethanol, Thymol, Ethylhexylglycerin

100 ml

Използва се за почистване на препуциума и гънките около него.

Начин на приложение
Моля, наблюдавайте дали има инфекции или други признаци, които изискват ветеринарна помощ. Почистете отвора на препуциума с памучен тампон, навлажнен с Foreskin Cleaner. Поставете спринцовка за еднократна употреба върху инжектора и я напълнете с Foreskin Cleaner. Инжектирайте Foreskin Cleaner в препуциума, като държите затворен. Масажирайте нежно, за да разпределите течността напълно. Оставете Foreskin Cleaner да изтече, след което избършете отвора с памук. Почиствайте препуциума веднъж седмично, в специални случаи всеки ден или при необходимост.



PAW SPRAY

Glycerol, Aqua, Aloe Vera

100 ml

Защита, подхранване и грижа за лапите и възглавничките. Да се използва преди ходене по хлъзгави, горещи, каменисти или други неприятни терени. Използвайте през зимата за защита от сол, лед, чакъл и други остри предмети.

Начин на приложение
Разклатете добре преди употреба. Напръскайте директно върху областта на лапите 1-2 пъти дневно или при необходимост. Оставете да подейства 1-2 минути.



PAW WAX

Aqua, Cera Alba, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene glycol, Dimethicone, Phenoxyethanol, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Potassium sorbate

50 g

Защитен крем за кучешки лапи.

Начин на приложение
Нанесете восъка върху лапите на кучетата. По този начин се създава силен защитен филм-слой, който предпазва възглавничките от вода и сняг. Бариерата също така предпазва възглавничките от сол, чакъл и други остри предмети, които могат да причинят малки, но дразнещи драскотини.




PAW BALM

Вазелин (Petrolatum); Пчелен восък (Beeswax); Бяло минералномасло (Paraffinum Liquidum); Феноксиетанол (Phenoxyethanol)

15 ml

Защита на възглавничките на лапите.

Начин на употреба:
Балсамът за лапи се нанася върху възглавничките на лапите на животното, за да ги предпази от вода, сняг, сол, чакъл и други външни фактори. Образува защитен филм срещу остри предмети, които могат да причинят малки, но неприятни наранявания и разкъсвания на възглавничките на лапите.



DIASTOP BLOOD STOP

Каолин, Железен сулфат, Алуминиев калий (калиево-алуминиева стипца), Силициев диоксид

30 g

Помага за спиране на кървенето, причинено от подрязване на нокти при кучета, котки, птици и гризачи, както и за спиране на кървенето при повърхностни рани. Същевременно има успокояващ ефект.

Начин на употреба

Нанесете праха върху кървящото място, за предпочитане с навлажнен памучен тампон.

Не използвайте при по-големи рани или върху увредена кожа.



UDDERCREAM

Aqua; Glyceryl Stearate (глицерил стеарат); Cera Alba (пчелен восък); Paraffinum Liquidum (течен парафин / минерално масло); Glycerin (глицерин); Cetearyl Alcohol (цетеарилов алкохол); Sodium Lauryl Sulfate (натриев лаурилсулфат); Sodium Cetearyl Sulfate (натриев цетеарилсулфат); Phenoxyethanol (феноксиетанол)Ethylhexylglycerin (етилхексилглицерин); Polysorbate 80 (полисорбат 80); Benzalkonium Chloride (бензалкониев хлорид); Potassium Sorbate (калиев сорбат); Eucalyptus Globulus Leaf Oil (масло от листа на евкалипт)

500 ml

Мек крем със защитен пчелен восък, който подпомага възстановяването на суха кожа и напукани цицки. Подхранва и овлажнява кожата.

Начин на употреба

Втрийте крема с масажни движения във вимето и цицките след доене.

Подходящ за всички селскостопански животни. Формулата е подходяща и за употреба от хора.



ODEURLESS SPRAY

Aqua, Bad Odor Remover complex

500 ml

Хигиенен продукт за отстраняване на лоши миризми. Odourless odour - remover spray отстранява, почиства, дезинфекцира и премахва лошите миризми. Той е ефективен срещу бактерии и вируси.

Начин на употреба:

Напръскайте с Odourless odour - remover spray в стаи с лоши миризми. Отстранява лошите миризми. Може да се използва за подове, маси и други водоустойчиви повърхности с лоши миризми. Напръскайте с Odourless odour - remover spray, там където вашия домашен любимец маркира територията си. Да не се използва в комбинация с други почистващи препарати.









LUBRICATION GEL

Лубрикантен гел

500 ml | 1000 ml

Отличен лубрикиращ гел, съдържащ синергично действащи съставки. За смазване на ръка, ръкавици, инструменти и т.н., за ректално или вагинално изследване. Също – полезна помощ при раждане.

Начин на употреба

Нанесете щедро и разпределете равномерно. Може да се премахне чрез изтриване с кърпа и/или измиване с вода и обилно количество сапун. Разлятият продукт трябва да се отстрани внимателно. Прави повърхностите хлъзгави.

ULTRASOUND GEL

Силно вискозен ултразвук гел

250 ml

Силно вискозен гел.
Важна помощ за оптимални резултати от ултразвуково сканиране за диагностични цели. Помага за поддържане на високо предаване на ултразвукови вълни.

Начин на употреба

Нанесете щедро и разпределете равномерно преди сканиране. Отстранете чрез избърсване и/или измиване с вода и сапун. Разлятият продукт трябва да се отстрани внимателно. Прави повърхностите хлъзгави.

CATHETER LUBRICATION GEL

Аспермициден лубрикантен гел

250 ml

Неспермициден лубрикантен гел.
За по-лесно поставяне на катетри при всякакъв тип катетеризация и изкуствено осеменяване.

Начин на употреба

Нанесете щедро и разпределете равномерно преди поставяне. Отстранете чрез измиване с вода и обилно количество сапун. Разлятият продукт трябва да се отстрани внимателно. Прави повърхностите изключително хлъзгави.





МИКРОЧИП

Инжектор с RFID транспондер в два размера в зависимост от големината и породата на животното.

1.4 x 8 mm | 2.12 x 12 mm

Микрочипове с европейско качество произведени в Германия.

1.4 x 8 mm
Амигриращ инжектируем транспондер с малък размер за малки породи.

2.12 x 12 mm
Амигриращ инжектируем транспондер със стандартен размер за средни и големи породи.

EURO ПАСПОРТ

Паспорт за кучета, котки и порчета

Паспорт за идентификация на домашни любимци (кучета, котки и порчета) утвърден от европейската комисия по образец в R576 и R577, относно движение на домашни любимци с нетърговска цел.
Паспортът е съставен от 32 страници със серия BG 01VT и индивидуален номер за всеки паспорт отпечатан на всяка страница. В средата на идентификационния документ (паспорт) са вградени ламинатни листове с прозрачно фолио с отпечатани на гърба инструкции за употребата им.
– Паспортът трябва да бъде попълнен на официалния език на държавата членка (Български) и на Английски език.
– При издаване на паспорт той задължително се заверява (Раздел IV. ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ) от упълномощен ветеринарен лекар.
– След поставяне на идентификационно средство (транспондер) се попълва (Раздел III. МАРКИРАНЕ НА ЖИВОТНОТО). След попълване на страницата, тя се ламинира с единия ламинатен лист разположен в средата на паспорта.
– След поставяне на ваксина против бяс в паспорта се попълва (Раздел V. ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС) дата на ваксинация, валидност на ваксинацията – от – до. Периодът на валидност на ваксинация започва да тече от създаването на защитен имунитет, който не може да е по-рано от 21 дни от датата на извършване на ваксинацията и продължава до края на срока на защитния имунитет описан в кратката характеристика на поставената ваксина против бяс.
– При пътуване, ваксината трябва да бъде поставена минимум 21 дена преди предстоящото пътуване и да не е пресрочен срока за реваксинация.
– Датата на поставяне на ваксината да не предхожда датата на поставяне на транспондера.
– Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани за други заразни заболявания по месоядните животни, различни от бяс, което да бъде отразено в (Раздел ДРУГИ ВАКСИНИ), както и да бъдат обезпаразитени 48 часа преди пътуването срещу ектопаразити и ехинококоза, като мероприятията се отразяват в паспорта на животното (Раздел VII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ЕХИНОКОКИ и Раздел VIII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ДРУГИ ПАРАЗИТИ) и са задължителни за домашните любимци пътуващи за Финландия, Ирландия, Малта и Великобритания.
– Когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.
– Паспортът на домашния любимец се заверява от обслужващия го упълномощен ветеринарен лекар в (Разрел X. КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД) с дата, подпис и печат 24 часа преди пътуването на животното, като се декларира, че то не показва симптоми на заразно заболяване и може да бъде транспортирано до предвиденото местоназначение.



ЗДРАВНА КНИЖКА

Здравна книжка за домашни любимци, предназначена за отразяване на важна информация за животното и извършените ветеринарномедицински дейности. Подходяща за домашни любимци.

Предназначение:
- данни за собственика;
- вписване на извършени ваксинации;
- отбелязване на обезпаразитявания и други ветеринарномедицински манипулации;
- проследяване на ветеринарномедицинската история.





ПАСПОРТ ЗА ДЕКОРАТИВЕН ЗАЕК

Паспортът съдържа следната кратка информация:

- Как да се грижим за зайчето;
- Заразни и паразитни болести;
- Профилактика срещу тях;
- Ваксинации с графи за записване;
- Обезпаразитяване с графи за записване;
- Профилактични прегледи с графи за записване.





PVC ПРОЗРАЧНА ПОДВЪРЗИЯ ЗА ПАСПОРТ

Варианти за поръчка:

1. PVC прозрачна подвързия – Чиста, без отпечатване върху нея.

2. PVC прозрачна подвързия с Ваш дизайн
– Отпечатване на гърба на подвързията рекламна информация за Вашата клиниката/амбулатория.
– Възможност за отпечатване и на логото Ви, единствено в бял цвят (изпратете векторно изображение, файл PDF).
– Минимално количество за поръчка – 200 бр.
– Предварително заплащане с проформа фактура по банков път.
– Срок на изработка: до две седмици.
– Изтеглете формата за попълване от нашия сайт www.vepco.bg, попълнете и изпратете заедно с Вашата поръчка на: office@vepco.bg







УШНИ МАРКИ ЗА ДПЖ

Изработени са от висококачествен термопластичен полиуретан (TPU), подходящ за продължителна употреба.

25 комплекта в опаковка

Съдържание на комплекта
Комплектът включва една мъжка и една женска електронна (RFID) оранжева ушна марка, както и една мъжка и една женска визуална жълта ушна марка.

Всички ушни марки са поставени в черен пластмасов блистер, като всяка е разположена в отделно легло за лесно подреждане и използване. Блистерът допълнително подсилва и защитава опаковката.

Регистрации и сертификация
Ушните марки са сертифицирани по стандартите ICAR и ISO и са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

УШНИ МАРКИ ЗА ЕПЖ

Изработени са от висококачествен термопластичен полиуретан (TPU), подходящ за продължителна употреба.

50 комплекта в опаковка

Съдържание на комплекта
Комплектът включва два броя мъжки + два броя женски жълти визуални ушни марки.

Регистрации и сертификация
Ушните марки са сертифицирани по стандартите ICAR и ISO и са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

КЛЕЩИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ

Инструкции за правилна употреба
1. Фиксирайте „мъжката“ ушна марка върху рамото на апликатора (клещите), снабдено с метален щифт.
2. Поставете „женската“ ушна марка върху другото рамо на апликатора.
3. Регулирайте позицията на „женската“ ушна марка чрез преместване на пластмасовото легло нагоре или надолу.

Пластмасовото легло трябва да бъде настроено така, че острието на „мъжката“ ушна марка да попадне точно в центъра на отвора на „женската“ марка. Винаги проверявайте тази настройка преди започване на работа.

Правилното позициониране на пластмасовото легло е важно за нормалната работа на апликатора. При неправилна настройка поставянето на ушните марки може да бъде затруднено, а металният щифт да се огъне или счупи.

Ако по време на поставяне забележите, че върхът на „мъжката“ ушна марка се огъва или се чупи, най-честата причина е твърде къс метален щифт, който не достига достатъчно навътре в острата част на марката. В такъв случай използвайте по-дълъг метален щифт.



ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА КОШЕР

Начин на поставяне
Разпробийте табелката в четирите ѝ края.
Направете отворите малко по-широки от диаметъра на видията, с която ще закрепите табелката за кошера.
Това е важно, за да избегнете напукването на табелката в мястото на закрепване, тъй като всички PVC материали имат различен температурен коефицент на разширение от този на дървото.

Табелата се поставя от дясната страна на предната част на капака на кошера (не върху капака на кошера), според изискванията на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.
При поставяне на табелата на кошери от полистирол (финландски), използвайте други фиксиращи елементи или силикон.





RATOSTOP PASTA

Бродифакум 0.0025 g / 100 g
Денатониум бензоат 0.001 g / 100 g

150 g | 2 kg

Родентицидна примамка под формата на паста.



RATOSTOP BLOCKS

Бромадиолон 0.0025 g / 100 g

40 g | 2 kg

Родентицидна примамка под формата на блокчета.



RATOSTOP ЛЕПИЛО

Леплива смес

135 g

Лепило за плъхове и мишки. Остава лепкаво за дълго време, не изсъхва и не се влияе от времето (от вода и влага).



VEPCO 10EC

Циперметрин 10.0 g / 100 g (10 %)

20 ml | 250 ml | 1000 ml

Течен инсектицид за разтваряне във вода за борба с пълзящи (бълхи, кърлежи, хлебарки, мравки, дървеници) и летящи (мухи, комари) насекоми.

Целеви животни
Кърлежи, бълхи, хлебарки, мравки, мухи, комари.



VEPCO POWDER

Циперметрин 0.25 g / 100 g

80 g

Прахообразен инсектицид за поръсване за борба с пълзящи (бълхи, кърлежи, хлебарки, мравки).

Целеви животни
Кърлежи, бълхи, хлебарки, мравки, мухи, комари.